

ANAIS

XIX Jornada de Iniciação Científica do IMIP

XIV Congresso Estudantil da FPS

XV Seminário Avançado de Saúde Integral do

IMIP

V Semana de Educação e Cultura da FPS

I Encontro de Extensão e Responsabilidade

Social da FPS

Recife

2023

COMISSÃO EXECUTIVA DO EVENTO

Ana Paula Pedrosa
Ana Rodrigues Falbo
Ana Telma Araripe
Andrea Echeverria
Aretuza Lima
Bárbara Letícia e Silva Araújo
Carla Adriane Fonseca Leal de Araújo
Cristianne Tomasi
Danielle Menor
Dayanne Albuquerque
Deborah Foinquinos
Doralice Gouveia
Edvaldo Souza
Fabrícia Padilha
Flávia Albuquerque
Flávia Patrícia Morais de Medeiros
Gabriel Antônio Figueredo Batista
Gilliatt Hanois Falbo Neto
Glauberty Cavalcanti
Jéssica Cavalcanti
Jessiklécia Josinalva de Siqueira
José Roberto da Silva Júnior
Josilene Alves
Juliany Vieira
Lígia Cristina Câmara Cunha
Lívia Andrade
Márcio Moraes
Marcone Barros
Maria Cristina dos Santos Figueira
Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo
Maria Goretti Lima
Maria Inês Bezerra de Melo
Maria Júlia Gonçalves de Mello
Pedro Araújo
Rozeval Oliveira
Shirlene Demétrio
Suelén Alves da Silva
Suely Arruda Vidal
Yale Araújo

Ficha Catalográfica
Preparada pela Faculdade Pernambucana de Saúde

F143j Faculdade Pernambucana de Saúde

XIX Jornada de Iniciação Científica do IMIP, XIV Congresso Estudantil da FPS, XV Seminário Avançado de Saúde Integral do IMIP, V Semana de Educação e Cultura da FPS, I Encontro de Extensão e Responsabilidade Social da FPS./ Faculdade Pernambucana de Saúde; organizadores Ana Paula Pedrosa, Ana Rodrigues Falbo, Ana Telma Araripe, Andrea Echeverria, Aretuza Lima, Bárbara Letícia e Silva Araújo, Carla Adriane Fonseca Leal de Araújo, Cristianne Tomasi, Danielle Menor, Dayanne Albuquerque, Deborah Foinquinos, Doralice Gouveia, Edvaldo Souza, Fabrícia Padilha, Flávia Albuquerque, Flávia Patrícia Moraes de Medeiros, Gabriel Antônio Figueredo Batista, Gilliatt Hanois Falbo Neto, Glauberty Cavalcanti, Jéssica Cavalcanti, Jessiklécia Josinalva de Siqueira, José Roberto da Silva Júnior, Josilene Alves, Juliany Vieira, Lígia Cristina Câmara Cunha, Lívia Andrade, Márcio Moraes, Marcone Barros, Maria Cristina dos Santos Figueira, Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo, Maria Goretti Lima, Maria Inês Bezerra de Melo, Maria Júlia Gonçalves de Mello, Pedro Araújo, Rozeval Oliveira, Shirlene Demétrio, Suelén Alves da Silva, Suely Arruda Vidal, Yale Araújo. – Recife: FPS, 2023.

169 f.

ISBN: 978-65-6034-101-2

1. Educação em saúde. 2. Iniciação científica. 3. Extensão e Responsabilidade. I. Título.

CDU 37:61

SUMÁRIO

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ACERCA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO BRASIL	15
VALOR CALÓRICO DO LEITE HUMANO DE DOADORAS ATENDIDAS EM UM BANCO DE LEITE HUMANO DO RECIFE-PE	16
ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL ADEQUADA: ESTUDO DE INQUÉRITOS POPULACIONAIS	17
CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DOS RECÉM-NASCIDOS OSTOMIZADOS DECORRENTES DA ENTEROCOLITE NECROSANTE.....	18
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE O CONHECIMENTO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM UM HOSPITAL ESCOLA EM RECIFE-PE	19
13 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO	20
AMAMENTAÇÃO E CONTATO PELE A PELE DE BEBÊS NASCIDOS EM UMA MATERNIDADE, RECIFE/PE.	21
PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE FRENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.....	22
PERFIL DAS GESTANTES PORTADORAS DE SÍFILIS EM UMA MATERNIDADE DE RECIFE	23
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES AMPUTADOS TRANSFEMORAIS.....	24
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL	25
COMPARAÇÃO DO STATUS VACINAL PARA PREVENÇÃO DO PAPILOMA VÍRUS HUMANO DURANTE E APÓS O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE PERNAMBUCO	26

FATORES PREDITORES DA SÍNDROME DE BURNOUT DESENVOLVIDOS EM ESTUDANTES DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: UM ESTUDO TRANSVERSAL	27
PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS NEONATAIS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA ASSISTÊNCIA NEONATAL DAS REGIÕES NORTE-NORDESTE DO BRASIL	28
REVISÃO DE ESCOPO: INTERVENÇÕES REALIZADAS EM EMPRESAS PARA GARANTIR A SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO.....	29
ANÁLISE DE INTEVENÇÕES FARMACÊUTICA EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DO RECIFE.....	31
PERFIL DE CONSUMO DOS ANÁLOGOS GLP-1 EM UMA FARMÁCIA PRIVADA NO RECIFE	32
UMA ABORDAGEM DO CUIDADO INTERPROFISSIONAL SOBRE A GARANTIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ EM AMBULATÓRIOS LGBT DAS CIDADES DE JABOATÃO, OLINDA E RECIFE.....	33
DESIGN DE FORMULAÇÃO TÓPICA COM AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA À BASE DE EXTRATO DE CURCUMA LONGA L.	34
AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM ÓXIDO DE ETILENO	35
AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA POTÁVEL UTILIZADA NOS BEBEDOUROS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE RECIFE	36
PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SOBRE GRUPO TUTORIAL INTERPROFISSIONAL NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) DE RECIFE-PE.	37
AVALIAÇÃO DOS GANHOS FUNCIONAIS DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO BASEADA NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE.....	39
QUALIDADE DE VIDA E GRAVIDADE DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA EM MULHERES ATENDIDAS NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP) NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE.	40

A PERCEPÇÃO DE RESIDENTES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPROFISSIONAIS DURANTE VIVÊNCIA DE PRÁTICA INTERDISCIPLINAR EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	41
FUNCIONALIDADE DE PACIENTES TRÊS ANOS APÓS A ALTA HOSPITALAR PELA COVID-19	42
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA	43
PERFIL DO TUTOR E DESEMPENHO DO ESTUDANTE EM TUTORIA REMOTA DURANTE A PANDEMIA PELA COVID-19.	45
SITUAÇÃO DA COBERTURA VACINAL E HPV EM ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL	47
FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE COLOPROCTOPATIA ACTÍNICA CRÔNICA E RESPOSTA À ABLAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO EM PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO TRATADAS COM RADIOTERAPIA PÉLVICA NO IMIP	48
ANÁLISE DA SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE RENAL	50
ESTUDO QUANTITATIVO E COMPARATIVO DA BASE SEMIOLÓGICA ENTRE ESTUDANTES DO CICLO CLÍNICO DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19	51
PERFIL DOS CASOS NOTIFICADOS DE MENINGITE BACTERIANA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA EM PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2011 A 2020	53
O EFEITO DA CABERGOLINA SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO	54
PADRÃO DE GRAVIDADE DA COVID-19 E DESFECHO ÓBITO CONFORME PERFIL VACINAL ENTRE PACIENTES COM RT-PCR POSITIVO NO HOSPITAL ALFA, RECIFE-PE	55
IMPORTÂNCIA DA TEMPESTADE DE IDEIAS PARA A MOTIVAÇÃO DO ESTUDO DIRIGIDO NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS	56
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PSQUIATRAS E RESIDENTES MÉDICOS EM PSQUIATRIA QUE UTILIZAM A TELEPSQUIATRIA NO BRASIL	58

RESISTÊNCIA AO TENOFOVIR E EMTRICITABINA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV-1, EM FALHA VIROLÓGICA, NO MARANHÃO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS MUTAÇÕES DE RESISTÊNCIA DO HIV-1 NAS MEDICAÇÕES UTILIZADAS PARA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO	59
CARTILHA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: UM GUIA PARA UMA COMUNICAÇÃO EFETIVA E O BEM ESTAR DO NÚCLEO PACIENTE-CUIDADORES	60
PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DA INFECÇÃO POR COVID-19 EM ESTUDANTES INTERNOS DE UMA FACULDADE DE SAÚDE DE PERNAMBUCO ..	61
AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ASA-PS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE OS ANESTESIOLOGISTAS DO IMIP	62
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM CIRROSE ALCOÓLICA EM AMBULATÓRIO DE HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO	63
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DA VEIA SAFENA MAGNA APÓS TERMOABLAÇÃO POR LASER	64
IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO DE PÓLIPOS DIMINUTOS RESSECADOS POR VIA ENDOSCÓPICA DE PACIENTES SUBMETIDOS À COLONOSCOPIA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP)	65
PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE SILENCIOSO SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO TUTORIAL NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS	67
A INFLUÊNCIA DA ESTÉTICA E DO CULTO AO CORPO NA AUTOESTIMA DE ESTUDANTES MULHERES DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA: UM ESTUDO QUALITATIVO	69
APENDICITE AGUDA EM PACIENTE COM SÍNDROME DA MÁ ROTAÇÃO INTESTINAL: UM RELATO DE CASO	70
DESENVOLVIMENTO DE PODCAST PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DO ESTUDANTE À APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS	71
ASSOCIAÇÃO ENTRE COGNIÇÃO, SAÚDE MENTAL E ESPIRITUALIDADE EM IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP) DE PERNAMBUCO.	73
DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS GESTACIONAIS NO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO DE UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA QUATERNÁRIA: UM CASO-CONTROLE.....	74

AVALIAÇÃO DE INFECÇÃO POR CMV E EBV NA DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO – UM ESTUDO DESCRITIVO RETROSPECTIVO.....	75
SÍNDROME DE KAWASAKI ATÍPICA EM MENOR DE 4 MESES: UM RELATO DE CASO.	76
INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UNIDADE DE CIRURGIA DE HOSPITAL PÚBLICO DO RECIFE.....	78
EFEITO PROTETOR ENTRE O SEXO MASCULINO E FEMININO DAS VACINAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19: UMA COORTE RETROSPECTIVA OBSERVACIONAL	79
USO DO OSCE NA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DESEMPENHO EM PRIMEIROS SOCORROS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	80
IMPACTO DO CLEARANCE DE CREATININA PRÉ-OPERATÓRIO COMO FATOR DE RISCO PARA INJÚRIA RENAL AGUDA NO PÓS-OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: COORTE RETROSPECTIVA EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NORTE-NORDESTE.....	81
O PERFIL DOS DOADORES DE FÍGADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2018 A 2021.....	82
PADRÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR SARS COV-2: UM ESTUDO TRANSVERSAL.....	83
NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D EM CASOS DA COVID-19: UM ESTUDO TRANSVERSAL	84
AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E ODONTOLOGIA	85
PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL ASSOCIADO À DISFUNÇÃO IMUNE DE PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL MUITO PRECOCE.....	87
SINTOMAS DE RINITE ALÉRGICA EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM HOSPITAL REFERÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 ...	88
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E SÍNDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE POR SARS-COV-2: UM ESTUDO TRANSVERSAL.....	89
MUDANÇAS NO PERFIL DE PACIENTES INTERNADOS EM UTI PEDIÁTRICA DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN	90

COINFECCÕES BACTÉRIANAS EM PACIENTES COM COVID-19 GRAVE INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE HOSPITAL TERCIÁRIO DO BRASIL	92
USO DE ANTI-HIPERTENSIVOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO NARRATIVA.....	93
PROCESSO DE MORTE E O MORRER: PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E DE PSICOLOGIA EM UMA FACULDADE NO NORDESTE DO BRASIL	94
EFEITOS PSIQUIÁTRICOS EM INDIVÍDUOS PÓS-INTERNAMENTO POR COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA.....	95
AVALIAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS NEBULIZADORES UTILIZADOS POR PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA ATENDIDOS NO IMIP: UM ESTUDO TRANSVERSAL.....	96
O TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS COMO MÉTODO PARA A AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PORTADORES DE VALVOPATIA.....	97
DEPRESSÃO PÓS-PARTO E SUPORTE SOCIAL EM PUÉRPERAS DE UM HOSPITAL REFERÊNCIA NO RECIFE: UM ESTUDO TRANSVERSAL.....	99
MEDIDAS DE CONTROLE DA DOR EM MULHERES COM DOENÇA FALCIFORME ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DE UM SERVIÇO DE SAÚDE EM RECIFE: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL.....	100
AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS DA SEDAÇÃO PALIATIVA EM PACIENTES EM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO NORDESTE DO BRASIL	101
FATORES ASSOCIADOS AO BRINCAR DE PRÉ-ESCOLARES RESIDENTES EM UMA COMUNIDADE ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO TRANSVERSAL	102
USO DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE SANGUE INTRAOPERATÓRIO EM UM CENTRO DE GRANDE VOLUME DE CIRURGIAS CARDIOVASCULARES.....	104
COLPOFIXAÇÃO SACROESPINHOSA TRANSGLÚTEA PARA CORREÇÃO DE PROLAPSO APICAL – PRODUÇÃO DE VÍDEO DEMONSTRATIVO DE TÉCNICA CIRÚRGICA MODIFICADA.....	105
DESFECHO MATERNO-FETAL EM GESTANTES E PUÉRPERAS INFECTADAS PELO COVID-19: EXISTE RELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA MATERNA? UM ESTUDO DE COORTE.....	106

PREVALÊNCIA DE SOFRIMENTO MENTAL EM IDOSOS EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL ATENDIDOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO	107
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL EM CRIANÇAS DE UMA COMUNIDADE DE BAIXA RENDA: ESTUDO TRANSVERSAL.....	108
AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A HANSENÍASE EM ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS: UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO.....	109
É HISTO! AVALIAÇÃO DE PODCASTS SOBRE HISTOLOGIA EM PLATAFORMAS DE STREAMING COMO ALIADOS NA EDUCAÇÃO MÉDICA	110
IMPACTO DO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME COMPRESSIVA EM TÚNEL OSTEO-FIBROSO AO NÍVEL DO CARPO NO BRASIL	111
CARDIOTOXICIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER TRATADOS COM ANTRACÍCLICOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA: UM ESTUDO TRANSVERSAL	113
FREQUÊNCIA DE VACINAÇÃO E MOTIVOS PARA HESITAÇÃO VACINAL PARA COVID-19 ENTRE CUIDADORES DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL.....	114
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E SOBREVÍDA DE CRIANÇAS COM NEUROBLASTOMA: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL	115
CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECANICA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE RECIFE	116
ESTADIAMENTO PATOLÓGICO DOS TUMORES COLORRETAIS E A CORRELAÇÃO RADIOLÓGICA DE METÁSTASES PULMONARES: QUEM SE BENEFICIA DA TOMOGRAFIA DE TÓRAX?.....	118
A VIVÊNCIA DA VIOLÊNCIA EM MULHERES: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL	119
DOAR SANGUE, DOAR VIDA: CONHECIMENTOS E MOTIVAÇÕES ACERCA DA DOAÇÃO DE SANGUE EM ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO NORDESTE BRASILEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL.....	120
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAS SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO.....	121

IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D NO CONTROLE DA DOR, FADIGA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO: SÉRIE DE CASOS E REVISÃO DA LITERATURA.....	122
FATORES ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	123
AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DE ANSIEDADE ENTRE ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO: UM ESTUDO DESCRITIVO.....	124
ETIOLOGIA E SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS DAS BACTÉRIAS ISOLADAS EM UROCULTURAS DE MENORES DE 5 ANOS ATENDIDOS EM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE REFERÊNCIA	125
A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	126
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E DA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE INDIVÍDUOS LGBTQIAPN+ NO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA	128
ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS CARDÁPIOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE UMA CRECHE DE RECIFE-PE.....	129
RELAÇÃO ENTRE SINAIS E SINTOMAS DE DISBIOSE INTESTINAL E ESTILO DE VIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	131
IMPACTO DO VESTIBULAR NO COMPORTAMENTO E QUALIDADE ALIMENTAR DE ESTUDANTES RECÉM-FORMADOS NO ENSINO MÉDIO	132
AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO FÚNGICA EM CONDIMENTOS COMERCIALIZADOS A GRANEL NA CIDADE DO RECIFE – PE.....	133
PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DISBIOSE INTESTINAL EM INDIVÍDUOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DO RECIFE.....	134
TRAÇOS DE ANSIEDADE E COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM PACIENTES COM HIV/AIDS ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL DE PERNAMBUCO	136
ASSOCIAÇÃO DE FATORES EXTERNOS E RISCO DE PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ADOLESCENTES DE ESCOLA PARTICULAR DE RECIFE/PE.....	138

DISTORÇÃO DA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL DE UNIVERSITÁRIOS DE SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DO NORDESTE BRASILEIRO.....	139
ADEQUAÇÃO DIALÍTICA E ESTADO NUTRICIONAL DE NEFROPATAS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO.....	140
IMPACTO DA DIETA CETOGÊNICA NO PERFIL LIPÍDICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EPILEPSIA FÁRMACORRESISTENTE EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO NORDESTE.....	141
FATORES ASSOCIADOS AO GANHO PONDERAL EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO.....	142
DEPRESSÃO E AUTOESTIMA DE IDOSOS COM PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS	144
DESAFIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORAL MENOR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SOB A PERSPECTIVA DO ODONTOPEDIATRA, CLÍNICO GERAL E CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL.....	145
EPIDEMIOLOGIA DA CÁRIE DENTÁRIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM FISSURA LABIOPALATINA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA	146
CONDIÇÃO PERIODONTAL E O USO DO CIGARRO ELETRÔNICO: UM ESTUDO TRANSVERSAL	147
INFLUÊNCIA DO LOCAL DE ORIGEM SOBRE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO DE PACIENTES COM FISSURA LABIOPALATINA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM PERÍODO PANDÊMICO.	148
ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DO TRAUMA FACIAL	149
DOENÇA PERIODONTAL NA GRAVIDEZ E A OCORRÊNCIA DE PARTO PREMATURO E BAIXO PESO AO NASCER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	150
BANCO DE DENTES HUMANOS: O QUE DOCENTES E DISCENTES SABEM SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.....	151
RESSIGNIFICAÇÃO DA VIDA A PARTIR DA CONSCIÊNCIA DE FINITUDE: UMA ANÁLISE DO FILME "ANTES DE PARTIR".....	154
PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM UM SETOR PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO RECIFE/PE, BRASIL.....	155

REPERCUSSÕES DA MÁ QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	156
BILINGUISMO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA INFÂNCIA: UM GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA PAIS	157
OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA POSITIVIDADE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ONCOLÓGICOS	159
PARA ALÉM DA ESQUIZOFRENIA: UMA ANÁLISE DO FILME PALAVRAS NAS PAREDES DO BANHEIRO	160
RELAÇÃO FRATERNA EM DESENHOS ANIMADOS INFANTIS: ANÁLISE DOCUMENTAL SISTÊMICA	161
COMO E POR QUE ALCANÇAR UM SONO DE QUALIDADE: UM GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.....	162
TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO: UMA CARTILHA PSICOEDUCATIVA	163
A PSICOLOGIA DO ESPORTE COMO UM CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: UM E-BOOK EDUCATIVO SOBRE A PRÁTICA ESPORTIVA.....	165
RELAÇÕES ABUSIVAS E SUAS REPERCUSSÕES NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE.....	166
ANÁLISE DA EFICÁCIA DE UM PROTOCOLO DE MINDFULNESS PARA SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.....	167
ASSOCIAÇÃO ENTRE AFETOS POSITIVOS E NEGATIVOS, AUTOESTIMA E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SAÚDE.....	168
A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: UM GUIA PRÁTICO PARA OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.	169
UMA CARTILHA INFORMATIVA PARA PAIS E CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA	170

ENFERMAGEM

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ACERCA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO BRASIL

Victoria Araújo Sousa Barbosa

Vita Guimarães Mongiovi

RESUMO

Objetivos: Analisar o conhecimento dos estudantes da graduação de enfermagem acerca da vacinação de Covid-19 no Brasil. **Métodos:** Pesquisa de natureza quantitativa, exploratória e descritiva, com os discentes de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES), que cursavam do 3º ao 10º período. A coleta de dados foi feita por meio de questionário online contendo perguntas sócio acadêmicas e referentes à vacinação contra COVID-19. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da FPS sob o número do CAAE 62446422.5.0000.5569. **Resultados:** Sobre o conhecimento dos discentes acerca da vacinação contra a COVID-19, 49% concordam parcialmente possuem conhecimentos relacionados a imunização, 88,2% concordaram totalmente que as vacinas contra a COVID-19 oferecem proteção contra o vírus e reduzem a morbimortalidade, 50,6% concordam totalmente que se sentem aptos a administrar a vacina e 4,7% não concordam sobre considerar que a imunidade coletiva é uma estratégia de diminuição do risco populacional para adquirir a COVID-19. **Conclusões:** Através dos resultados encontrados, levando em conta o número de alunos que alegaram possuem conhecimentos sobre a vacinação contra COVID-19 (32,9%), conclui-se que o conhecimento dos discentes foi satisfatório, apesar das dificuldades encontradas.

Palavras-chave: COVID-1; vacinação; pandemia da Covid-19

VALOR CALÓRICO DO LEITE HUMANO DE DOADORAS ATENDIDAS EM UM BANCO DE LEITE HUMANO DO RECIFE-PE

Natalia Nunes branco

Sandra Hipólito Cavalcanti

RESUMO

Introdução: A amamentação exclusiva é indicada para bebês até os seis meses de vida, e, segundo a OMS, apresentam vários benefícios, tanto para criança, como para mãe. Estudos comprovam que o leite humano contém todos os nutrientes em qualidade e quantidade ideais para o recém-nascido. Contudo, vários fatores associados à doadora podem interferir na qualidade do leite humano, incluindo alterações no teor lipídico e em seu índice calórico.

Objetivo: Estabelecer a relação entre o valor calórico do leite humano com as características das doadoras do Banco de Leite Humano do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira-IMIP. **Método:** Estudo descritivo, retrospectivo de corte transversal, com dados extraídos do trabalho de pesquisa “Leite humano e fatores associados ao seu valor calórico” cujas informações foram coletadas no BLH do IMIP no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. A amostra foi composta por 80 fichas de doadoras de leite materno no período citado após análise no programa EpiInfo para Windows na versão 3.5.3. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP com o CAAE: 56239822.2.0000.5201

Resultados: As maiores frequências do leite materno foi hipercalórica (48,75%), idades da doadora acima de 21 anos (96,25%), maior prevalência do grau de instrução foi acima de 12 anos de estudos (51,25%), doadoras com o IMC adequado (48,75%) em relação ao peso do bebê ao nascer o mais frequente foi acima de 2,500g (95%) e o consumo de álcool e cigarro não foram variáveis observadas com possíveis influências nas características das doadoras.

Conclusão: Conclui-se que, da análise realizada, fora verificada a prevalência do leite materno hipercalórico, independente do estado nutricional maternal, porém existe ainda poucas pesquisas relacionadas ao valor calórico do leite materno, onde também são necessárias novas políticas de incentivo para as mulheres doarem, garantindo a qualidade de vida dos bebês graves.

Palavras-chaves: aleitamento materno; banco de leite humano; tratamento físico-químico

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL ADEQUADA: ESTUDO DE INQUÉRITOS POPULACIONAIS

Vitória Samara Tenório Celestino Dourado

Maria de Fátima Costa Caminha

RESUMO

Objetivo: Analisar a evolução temporal da assistência pré-natal adequada referente ao número de consultas e realização de exames no Estado de Pernambuco através dos inquéritos realizados nos anos 1997, 2006 e 2016. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal de base populacional, executado mediante dados secundários retirados dos bancos de dados da II, III e IV Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, realizadas no Estado de Pernambuco. Foram descritas as variáveis: número de consultas, realização de exames de sangue para anemia, sífilis, diabetes e HIV, exame de urina, toxoplasmose, hepatite e citológico. **Resultados:** Observou-se aumento quanto ao número de consultas nos anos 1997, 2006 e 2016. Em 2006, 37,7% apresentaram pré-natal adequado, já em 2016 esse valor foi de 50,4%. Quanto ao exame de HIV teve aumento em 2016 comparado a 2006. Em 2016 houve prevalência de realização do exame de hepatite 75,2%, seguido por toxoplasmose 60,0% e citológico 31,6%. **Conclusão:** Observou-se aumento da tendência temporal quanto à realização de consultas nos anos 1997, 2006 e 2016 e exames laboratoriais entre os anos de 2006 e 2016. Esses dados poderão auxiliar na redução índices de mortalidade materno-infantil que ainda acontecem no estado de Pernambuco e no país. **Palavras-chaves:** cuidados pré-natal; saúde da mulher; gestantes; inquéritos; epidemiológicos

CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DOS RECÉM-NASCIDOS OSTOMIZADOS DECORRENTES DA ENTEROCOLITE NECROSANTE

Maria Eduarda Aurora Batista Cavalcanti

Claudiane Maria Urbano Ventura

RESUMO

Introdução: A enterocolite necrosante é uma grave gastroenterite que acomete os recém-nascidos, principalmente prematuros, onde a depender do estadiamento podem ser ostomizados para fins terapêuticos. Diante da gravidade, precisam de internamento em UTI ou UCI neonatal para serem assistidos continuamente pela equipe de enfermagem, sendo necessário o conhecimento prático-teórico para garantir assistência segura e de qualidade. **Objetivo:** Avaliar o conhecimento, atitude e prática da equipe de enfermagem acerca dos recém-nascidos ostomizados decorrentes da enterocolite necrosante. **Método:** Trata-se de um estudo de coorte transversal, de caráter descritivo, exploratório e de abordagem quantitativa, que será realizada na UTI Neonatal do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) no período de fevereiro de 2023 até novembro de 2023. A população de estudo será composta de todos enfermeiros e técnicos de enfermagem atuantes na UTI/UCI neonatal do IMIP. **Resultados:** verificou-se quanto ao gênero prevalência feminina sendo 48 (100%) participantes. Constatou-se também o conhecimento, atitude e prática acerca da temática abordada adequado, visto que mais de 50% das questões foram respondidas corretamente. **Discussão:** Nos dados sociodemográficos, o gênero feminino prevaleceu ao compará-lo com diversos estudos. Em relação ao conhecimento e atitude, a maioria das assertivas foram respondidas corretamente, já o bloco prática houve mais oscilações nos resultados. **Conclusão:** Conclui-se que os pilares conhecimento, atitude e prática dos profissionais de Enfermagem acerca dos recém-nascidos ostomizados pela ENC é adequado, porém observa-se certa fragilidade, fazendo necessária a implementação teórico-prática de educação em saúde e ampliação nas pesquisas, devido à escassez de estudos em relação a temática.

Palavras-chaves: cuidados de enfermagem; enterocolite necrosante; ostomia; recém-nascido, unidade de terapia intensiva neonatal

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE O CONHECIMENTO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM UM HOSPITAL ESCOLA EM RECIFE-PE

Bruna Maria Nunes Alves

Rubiane Gouveia de Souza e Silva

RESUMO

Introdução: As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), consiste em eventos adversos, tornando-se um grave problema para a saúde pública do país, podendo ser adquirido durante a internação ou após a alta. Entre as IRAS, evidenciam-se as infecções do sítio cirúrgico, como a principal complicação relacionada ao ato cirúrgico, podendo afetar, tecidos, órgãos ou cavidades durante a inserção. **Objetivo:** Descrever o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca do conhecimento da infecção do sítio cirúrgico em um hospital escola em Recife-PE. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, transversal, com abordagem quantitativa realizado no período de agosto a setembro de 2023 no IMIP. A coleta foi realizada de maneira presencial, com os profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na assistência nos respectivos setores: centro obstétrico, 4º CAM, 5º CAM, 6º CAM, ambulatório da mulher, bloco transplante, bloco oscar, ambulatório de cardiologia, e enfermaria cardiologia. Coletamos os dados através de aplicação de questionários impressos. Após obter todas as respostas, foram registrados no formulário eletrônico, através do Google Forms. Em seguida, houve a elaboração de uma planilha, com o objetivo de armazenar todas as informações, por meio do programa EXCEL, e através da mesma plataforma, elaborou-se gráficos e tabelas a fim de apresentar os resultados. **Resultados:** A coleta resultou em 131 respostas de profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nos setores selecionados. Analisamos que 24 (18%) pessoas, receberam treinamento sobre prevenção de ISC e 107 (82%) pessoas, não receberam o treinamento, referente aos últimos 6 meses. **Conclusão:** Com base nos resultados do estudo, ressalta-se que os enfermeiros precisam ser devidamente treinados e aptos a prestar uma assistência de qualidade, identificar os fatores de risco que provocam as infecções do sítio cirúrgico, ter conhecimento teórico sobre a ISC e como intervirem diante de uma situação.

Palavras-chaves: Infecção do sitio cirúrgico, perfil sociodemográfico; enfermagem; IRAS

13 CERTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO

Isabely Vitória Silva Alves
Sandra Regina Silva de Moura

RESUMO

Objetivo: Elaborar e validar instrumento educativo para promover o uso seguro de medicamentos. **Método:** Estudo com abordagem de análise de conteúdo, realizado em três etapas: revisão da literatura, elaboração da lista de verificação dos 13 certos da administração de medicamentos e consulta a especialistas. **Resultados:** Após a revisão da literatura e a construção do instrumento, foram selecionados profissionais e destes, 13 enfermeiros aceitaram participar, sendo 46,2% mestres, 46,2% possuíam mais de 15 anos de atuação, 84,6% lidam com medicamentos na prática, 100% conhecem os certos da administração de medicamentos e 92,3% já presenciaram eventos adversos medicamentosos. Com relação a validação do conteúdo, o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) global foi de 0,97 e 10 das 13 categorias, obtiveram índice igual a 1,00, que é o padrão ouro. **Discussão:** A construção e validação de instrumentos educativos na área da saúde, é essencial para aplicação das evidências na prática, promovendo a qualificação dos profissionais e de sua atuação. E em atividades complexas como o uso de medicamentos, o uso de tecnologias educacionais é um facilitador da adesão às boas práticas. **Conclusão:** O processo de validação aprimorou o instrumento “Administração de Medicamentos 13 Certos” construído, com as experiências e expertises de outros profissionais. **Palavras-chaves:** Estudo de validação; tecnologia educacional; erros de medicação; enfermagem

AMAMENTAÇÃO E CONTATO PELE A PELE DE BEBÊS NASCIDOS EM UMA MATERNIDADE, RECIFE/PE.

Maria Cecília de Paula
Sandra Hipólito Cavalcanti.

RESUMO

Introdução: Estudos mostram que o contato pele a pele entre mãe-filho ajuda no processo da amamentação proporcionando benefícios nutricionais, fisiológicos e psicossociais para ambos por isso precisa ser estimulado. **Objetivo:** Identificar as características maternas com a realização do contato pele a pele e a amamentação de bebês nascidos em uma maternidade em Recife/PE. **Método:** Estudo de corte transversal e quantitativo, onde utilizou-se dados secundários do trabalho original “Contato pele a pele em Recém-Nascidos aptos para amamentar sob a perspectiva das puérperas de uma maternidade, Recife/PE onde a amostra foi determinada por conveniência, composta por 154 puérperas. As entrevistas ocorreram entre julho e outubro de 2016. A coleta só foi iniciada mediante aprovação do Comitê de Ética do IMIP, sob CAAE: 55478316.9.0000.5201. **Resultado:** Os dados foram divididos em categorias e identificaram os principais fatores influenciadores para promoção do contato pele a pele e do aleitamento materno (AM). Dentre as puérperas, 73,4% tinham entre 18 e 35 anos, 67,5% moravam no Grande Recife, 56,5% estudou de 9 a 12 anos e a maioria delas tiveram seus filhos por parto vaginal (64,3%). O contato pele a pele foi realizado em 80,5% dos casos e 49,4% dos bebês mamaram na primeira hora de vida. No entanto, 50,6% dos bebês não mamaram nesse momento. **Conclusão:** Assim, são imprescindíveis atividades educativas para profissionais de saúde e reorganização das rotinas mecanizadas dos hospitais, a fim de garantir o cumprimento do contato pele a pele e do aleitamento materno na sala de parto.

Palavras-chaves: Aleitamento materno; contato; vínculo; sala de parto

PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE FRENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Laura Cavalcanti e Silva

Luciana Marques Andreto

RESUMO

Objetivo: Analisar a percepção dos estudantes de saúde de uma IES sobre o preparo técnico-profissional no atendimento integral a saúde das PcD durante a graduação. **Método:** Estudo qualitativo e transversal, através de entrevistas semiestruturadas, com os discentes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, o qual ocorreu no período de setembro de 2022 a setembro de 2023. Para análise dos dados, utilizou a técnica de Análise de Conteúdo Temática segundo Laurence Bardin. A pesquisa foi aprovada CEP em Seres Humanos da FPS sob o número 63665222.9.0000.5569. **Resultados:** Foram entrevistados 35 discentes distribuídos nos cursos selecionados. A maioria era sexo feminino (82,86%), entre 20 e 24 anos (74,29%), de cor branca (62,86%) e sem parentes com deficiência (62,86%). O conteúdo das entrevistas dos discentes foi organizado nas categorias temáticas: “Conhecimentos prévios e experiências dos discentes”, “Papel da graduação e dos profissionais de saúde no atendimento” e “SUS e suas políticas públicas”. **Conclusão:** Com objetivo do atendimento integral às PcDs, é necessário o aprimoramento técnico-científico desde a graduação, sendo importante para a formação desses futuros profissionais com uma comunicação efetivas, técnicas de manejo apropriadas, além da responsabilidade social com essa população no SUS.

Palavras-chaves: Acesso aos serviços de saúde; pessoas com deficiência; políticas públicas; ensino superior; assistência integral à saúde; pesquisa qualitativa

PERFIL DAS GESTANTES PORTADORAS DE SÍFILIS EM UMA MATERNIDADE DE RECIFE

Marcela Mayne de Almeida Sial

Luciana Marques Andreto

RESUMO

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico das gestantes portadoras de sífilis internadas em uma maternidade pública da cidade do Recife. **Método:** Estudo descritivo quantitativo, realizado no período de setembro de 2022 a setembro de 2023, através da análise do banco de dados epidemiológicos referente aos casos de sífilis em gestantes notificadas pela maternidade Professor Bandeira Filho. Os dados foram analisados através do teste de Qui-quadrado para verificação da independência das variáveis. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, CAAE nº 63377922.5.0000.5569. **Resultados:** Foram analisadas 531 gestantes no período entre 2018 e 2022. Dos dados analisados, as variáveis mais prevalentes para a sífilis em gestantes foram: a faixa etária dos 20 aos 29 anos (62,57%), a zona urbana (99,81%), o distrito sanitário V (45,09%) e o período gestacional do 3º trimestre (88,05%). No que concerne ao teste treponêmico no pré-natal houve maior prevalência dos resultados reagentes (94,90%), no entanto, o número de parceiros não tratados concomitantemente à gestante prevaleceu (75,68%). **Conclusões:** Gestantes internadas na maternidade, em sua maioria, são jovens adultas com baixa escolaridade, residência próxima à maternidade, tratadas adequadamente e cujos parceiros não foram tratados simultaneamente. **Palavras-chaves:** Sífilis; gravidez; complicações infecciosas na gravidez

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES AMPUTADOS TRANSFEMORAIS

Ana Carolina Pereira de Crasto Britto Martins

Suzana Lins

RESUMO

Objetivos: Avaliar a qualidade de vida através dos domínios do instrumento Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36), em adultos após amputação transfemoral, em Centro Especializado em Reabilitação. **Métodos:** Estudo descritivo do tipo transversal, de abordagem quantitativa, com base no projeto âncora “Tradução e adaptação transcultural do Questionnaire for Persons with a transfemoral amputation (Q-TFA)”. A população do estudo foi composta por pacientes acompanhados no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) em um Hospital Escola do Nordeste do Brasil. Incluíram-se os que foram submetidos à amputação transfemoral protetizados, maiores de 18 anos e excluídos os participantes que não frequentavam o CER-IV-IMIP durante o período de coleta e que possuíam amputação bilateral ou outro nível de amputação e/ou que possuam algum comprometimento cognitivo e/ou emocional que dificulte a compreensão e participação das etapas do estudo. Para coleta de dados foi utilizado o instrumento SF 36 versão curta para análise da qualidade de vida, além da aplicação de instrumento previamente traduzido e adaptado ao contexto brasileiro. Os dados foram descritos sob a forma de distribuição de frequências. **Resultados:** De acordo com o perfil sociodemográfico dos pacientes, 75% eram do sexo masculino enquanto 24% do sexo feminino, com idade variando de 26 a 80 anos com maior incidência na faixa etária de 54 a 72 anos. A análise apresentou uma diferença quanto a qualidade de vida em oito domínios do Instrumento SF-36: Capacidade funcional, Limitação por aspectos físicos, Dor, Estado geral de saúde, Vitalidade, Aspectos sociais, Aspectos emocionais e Saúde mental. **Conclusão:** Os domínios Dor, Limitação por aspecto físico, Vitalidade e Saúde mental foram avaliados mais positivamente. Percebeu-se vínculo positivo entre o tempo de amputação, o processo de reabilitação e a melhoria na qualidade de vida global.

Palavras-chaves: amputação transfemoral; mobilidade; prótese; qualidade de vida; instrumento sf36; reabilitação

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA EM ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL

Célio Alves Cavalcanti Neto

Suzana Lins da Silva

RESUMO

Objetivo: analisar o diagnóstico nutricional e risco cardiovascular de pacientes pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica acompanhados pela equipe multiprofissional em um hospital escola do Nordeste do Brasil. **Método:** Estudo avaliativo, transversal, recorte do projeto âncora “Tradução e Adaptação Transcultural do questionário “A new questionnaire for quick assessment of food tolerance after bariatric surgery”, com dados coletados de julho a setembro de 2022, analisados e digitalizados em uma planilha do Excel para compor o banco de dados. O trabalho âncora foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 55557722.4.0000.5201. **Resultados:** Foram abordados 69 pacientes, dentre eles voluntários pré e pós bariátricos, entre 22 e 64 anos de idade. 91,3% dos participantes eram do gênero feminino. A média da idade foi de 44 e o grau de obesidade mais evidente foi o III obtendo o percentual de 69,2% entre os pacientes pré operatório, enquanto o grau de obesidade zero representou os pacientes pós-operados resultando totalizando 35,3% caracterizados como sobrepeso. Ao avaliar as comorbidades a mais frequente entre os pacientes foi a HAS, resultando em 65,4% nos pacientes pré-bariátricos e 17,7% nos pós-bariátricos. A circunferência da cintura (CC) demonstrou valores expressivos em ambos sexos antes da gastroplastia e queda abrupta após sua realização. Ao examinar os episódios de regurgitação foi visto que 32,7% de pacientes pré-operatório confirmam ocorrências ao mesmo tempo que 58,8% dos pós-bariátricos afirmam tais episódios. **Conclusão:** Apesar de invasiva a cirurgia bariátrica surge como uma alternativa para a perda de peso eficaz, controle das comorbidades e diminuição do risco de acometimentos metabólicos e cardiovasculares, contribuindo para o prolongamento da expectativa de vida daqueles submetidos.

Palavras-chaves: obesidade; intolerância alimentar, cirurgia bariátrica, redução de peso, questionnaire

COMPARAÇÃO DO STATUS VACINAL PARA PREVENÇÃO DO PAPILOMA VÍRUS HUMANO DURANTE E APÓS O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE PERNAMBUCO

Micheline Mauricio de Carvalho Lima

Eliane Mendes Germano Lins

RESUMO

Objetivos: Analisar a frequência da vacinação contra HPV e fatores associados de pacientes do Ambulatório de Pediatria do IMIP após o período da pandemia do COVID-19, comparado ao período pandêmico. **Método:** Estudo transversal realizado com 90 pacientes entre 9 e 18 anos do Ambulatório de Pediatria do IMIP após o período da pandemia do COVID-19. Os dados foram coletados através de entrevista, armazenados no Formulários Google, organizados em tabelas de frequência 2x2. Solicitou-se assinatura do TCLE e TALE. Resultados: Constatou-se que 83.3% tinham entre 9 e 14 anos, sem predominância entre os sexos. 51.1% do interior e outros estados. 37.8% eram católicos e 64.4% das genitoras tinham escolaridade de até 9 anos com 62.2% vivendo com até um salário mínimo. 54.4% tinham auxílio social. 53.4% apresentaram esquema completo, e dos 46.7% com esquema incompleto, 51.1% justificaram desinformação relacionada à vacina/vírus. Comparado com estudo anterior, apresentou-se diminuição de 9.4% no esquema completo ou dentro do prazo. **Conclusão:** As maiores porcentagens dos participantes apresentaram esquema dentro do esperado para a idade em ambos os estudos, havendo diminuição pós pandemia. A principal justificativa para a não vacinação foi a desinformação, sugerindo necessidade de campanhas em prol de uma taxa de adesão satisfatória.

Palavras-chaves: Imunização; papiloma viridae; infecções por papiloma vírus; criança; adolescente

FATORES PREDITORES DA SÍNDROME DE BURNOUT DESENVOLVIDOS EM ESTUDANTES DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Emilyn Alves Dias

Rubiane Gouveia de Souza e Silva

RESUMO

Objetivo: Identificar a existência de fatores preditores da Síndrome de Burnout nos estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde que estão atuando no estágio curricular obrigatório. **Método:** Traduz-se em um estudo exploratório, descritivo e transversal, com metodologia quantitativa realizado em agosto de 2023 utilizando os instrumentos "Maslach Burnout Inventory-Student Survey", "Perceived Stress Scale" e "Utrecht Work Engagement Scale" abrigados num formulário único na plataforma Google Forms. Os dados foram digitados, codificados e analisados na plataforma Microsoft Office Excel e apresentados em tabelas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP CAAE nº 73866323.8.0000.5201. **Resultados:** Foram coletadas 66 respostas ao formulário, sendo 46 (69,7%) entre os 18 e 24 anos de idade, 52 (78,8%) mulheres cis-gênero, 47 (71,2%) consideraram-se brancos, 53 (80,3%) disseram que não exercem nenhuma atividade remunerada e 58 (87,9%) mora com outra pessoa. **Conclusão:** Não encontrou-se relação entre a síndrome e a maioria das variáveis sociodemográficas, excetuando-se a análise de idade, observando uma incidência nas pessoas mais jovens. Além disso, muitos estudantes apresentaram exaustão emocional e ineficácia profissional. Em contrapartida, não houve rebaixamento dos níveis de engajamento nos estudos, apesar das demandas acadêmicas. **Palavras-chaves:** estudantes; esgotamento psicológico; internato e residência; universidades

PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS NEONATAIS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA ASSISTÊNCIA NEONATAL DAS REGIÕES NORTE-NORDESTE DO BRASIL

Isabela Marques Borba

Sandra Regina Silva e Moura

RESUMO

Objetivo: Descrever o perfil clínico epidemiológico dos óbitos neonatais em um hospital de referência na assistência neonatal da região norte-nordeste do Brasil. **Método:** trata-se de um estudo de corte transversal descritivo e exploratório, de caráter quantitativo, utilizando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), alimentado pelas Declarações de Óbito (DO) dos anos de 2018 a 2022 e instalado na Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). **Resultados:** Foram identificados 1.117 óbitos neonatais no período do estudo, o que representa um coeficiente de mortalidade neonatal de 48,9 por mil nascidos vivos. Predominando os neonatos < 7 dias de vida (69,7%), com peso adequado (38,2%), oriundos de gestações únicas (89,2%) e com idade gestacional entre 22 e 36 semanas (57,1%). E as principais causas de óbito estão relacionadas aos capítulos XVII e XVI da CID-10, 54,6% e 42,8% respectivamente. **Discussão:** Os dados encontrados em nosso estudo corroboram com a literatura, quando equiparados à instituições de alta complexidade. **Conclusão:** As principais causas de óbito estão relacionadas a malformações e afecções originadas na gestação, enfatizando a importância da realização oportuna e adequada do pré-natal.

Palavras-chaves: Indicadores de morbimortalidade; mortalidade neonatal precoce; unidades de terapia intensiva neonatal

REVISÃO DE ESCOPO: INTERVENÇÕES REALIZADAS EM EMPRESAS PARA GARANTIR A SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO

Maria Gabryella Da Hora Moura
Elisangela Chisthianne Barbosa da Silva Gomes

RESUMO

Introdução: Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, houve mudanças na configuração da sociedade que impactaram diretamente o aleitamento materno, tornando-o desfavorável após o retorno laboral. Em vista disso, em 2010, foi anunciada uma estratégia por meio de uma nota técnica da Anvisa com o Ministério da Saúde: a Sala de Apoio à Amamentação em empresas. Estudos recentes apontam que 100% das empresas captadas não possuem salas de apoio à amamentação e apenas 45% dessas tinham algum lugar disponível caso fosse necessário. Por existir uma grande lacuna científica na literatura a respeito destas salas, este estudo se propõe a realizar uma revisão de escopo sobre as intervenções realizadas em empresas públicas e privadas para garantir a implementação dessa sala. **Método:** revisão de escopo nas bases de dados BVS, ANVISA, LILACS, Scielo através das palavras chaves até agosto de 2023. **Resultados e discussão:** Após a análise bibliográfica, 10 estudos foram incluídos nesta revisão, representando 100% dos artigos referentes à amamentação, destes, somente 6 (60%) tinham relação com o tema, pois abordavam sobre as dificuldades de implementar a sala de amamentação nas instituições. **Conclusão:** Esta revisão evidencia que não há obstáculos na conciliação das responsabilidades maternas, desde que haja um suporte adequado.

Palavras-chaves: Aleitamento materno; mulher trabalhadora, sala de amamentação, sala de apoio à amamentação

FARMÁCIA

ANÁLISE DE INTEVENÇÕES FARMACÊUTICA EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DO RECIFE

Luiz Vinicius De Moraes Santana

Suellen Karla Silva Guerra

RESUMO

Introdução: A intervenção farmacêutica é uma conduta planejada, documentada e implementada com usuários e profissionais de saúde para resolver ou prevenir problemas que interferem ou têm potencial de interferir na terapia medicamentosa e são parte integrante do processo de monitoramento da mesma. Os Indicadores de desempenho constituem uma peça importante no processo da intervenção, sendo utilizado para avaliar e melhorar determinados processos dentro da farmácia, onde esses critérios oferecem aos responsáveis dados que podem apoiar a manutenção ou expansão dos serviços exercidos a fim de fornecer cuidados adequados baseados em evidências, desempenhando um papel fundamental na busca pela qualidade do serviço. **Objetivos:** O objetivo do estudo foi analisar as intervenções farmacêuticas realizadas durante a validação da prescrição médica e destacar a relevância dos indicadores de saúde como reflexo dos resultados da avaliação da prescrição e ressaltar o propósito dos farmacêuticos em uma instituição hospitalar de Recife – PE. **Métodos:** Esse estudo é observacional e retrospectivo realizado a partir do método quali-quantitativo, realizado por estudantes de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde, os dados explorados foram de um período de 6 meses de julho a dezembro de 2022. **Resultados:** Foram avaliados os dados de 28.782 prescrições médicas, contemplando 164.296 itens prescritos dispensados pela farmácia. Sendo que o Leito Retaguarda Feminino (43,2%) referiu maior taxa de Itens Não Atendidos, seguida pela Oncologia (17,7%) e Clínica Médica Feminina (8,8%). Tratando-se do percentual de Itens Inclusos, a UTI Cirúrgica (13,0%) foi a que mais apresentou inclusão, seguida da UTI COVID 1 (11,7%) e da UTI Transplante (10,9%). **Conclusões:** A importância dos indicadores como estratégias de gestão pelos farmacêuticos para monitorar o processo de dispensação e minimizar erros, garante segurança ao paciente e ao mesmo tempo qualidade do serviço e maior performance para a gestão da farmácia hospitalar.

Palavras-chave: serviço de farmácia hospitalar; assistência farmacêutica; indicadores de gestão; serviço de farmácia hospitalar; assistência farmacêutica; indicadores de gestão

PERFIL DE CONSUMO DOS ANÁLOGOS GLP-1 EM UMA FARMÁCIA PRIVADA NO RECIFE

Ana Paula Oliveira das Chagas Silva
Maria Nelly Sobreira de Carvalho Barreto

RESUMO

Introdução: Analisar o perfil de consumo dos Análogos GLP-1 dispensados pela farmácia e seu quantitativo de vendas. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa utilizando dados secundários no sistema terminal de consulta gerencial (TCG) da farmácia, no período de outubro de 2022 a Março de 2023, com representantes dos análogos GLP-1 Liraglutida e Semaglutida. A pesquisa foi autorizada através da carta de anuência. **Resultados:** dos análogos GLP-1, a Semaglutida, injetável e seus representantes orais, correspondem a (86,6%) das vendas, a Liraglutida com (13,4%) dos seus respectivos representantes. **Conclusão:** Uma vez que a proposta de perda de peso é atrativa e necessária para um número cada vez maior de pessoas, a procura e a propaganda desses medicamentos torna-se crescente. Esta procura desenfreada pode trazer impactos na população e, portanto, faz-se fundamental a presença do farmacêutico no ato da dispensação para evitar o uso irracional deste tipo de fármaco.

Palavras-chave: peptídio semelhante ao glucagon-1(GLP-1); diabetes; obesidade; peptídio semelhante ao glucagon-1(GLP-1); diabetes; obesidade

UMA ABORDAGEM DO CUIDADO INTERPROFISSIONAL SOBRE A GARANTIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ EM AMBULATÓRIOS LGBT DAS CIDADES DE JABOATÃO, OLINDA E RECIFE

Monaliza Freire Rodrigues

Mônica Maria Henrique dos Santos

RESUMO

Introdução: A atividade interprofissional contribui para resultados positivos para o paciente, a interconexão profissional promove completude na assistência ao indivíduo. A Política LGBTQIAPN+ busca promover a saúde integral da comunidade, eliminando a discriminação e o preconceito institucional através de atuações interprofissionais contribuindo na redução das desigualdades e consolidação dos princípios doutrinários do SUS. O estudo foi desenvolvido nos ambulatorios LGBT das cidades de Jaboatão, Olinda e Recife, dando subsídios para adoção de medidas de educação em saúde direcionadas à melhoria do cuidado. **Objetivos:** Avaliar e identificar as melhores práticas nas equipes de assistência à comunidade LGBTQIAPN+, quanto aos desenvolvimentos interprofissionais. **Método:** Estudo avaliativo com abordagem quali-quantitativa, com dados adquiridos através de questionário adaptado da Escala de Prontidão para Aprendizagem Interprofissional (RIPLS), seguindo escala psicométrica para avaliar o conhecimento e a aptidão do profissional em exercer o interprofissionalismo. **Resultados:** Dos 28 profissionais, 82% responderam os formulários. Na Escala RIPLS, 96% declararam nunca terem respondido o formulário anteriormente, enquanto 4% sim. Na percepção dos participantes sobre as práticas do cuidado, quanto aos profissionais de nível superior, nos Fatores 1 e 3 enquadraram-se na Zona de Conforto, enquanto no Fator 2 na Zona de Alerta. Os de nível técnico, para o Fator 3, estão na Zona de Conforto e no Fator 2 na Zona de Alerta. 73% dos profissionais de nível superior tiveram alguma experiência com a interprofissionalidade, embora incipiente. **Conclusão:** A prática interprofissional, ainda está no início de seu desenvolvimento; tendo como desafio inicial a “formação do profissional”.

Palavras-chave: Pessoas LGBT; relações interprofissionais; atenção primária à saúde

DESIGN DE FORMULAÇÃO TÓPICA COM AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA À BASE DE EXTRATO DE CURCUMA LONGA L.

Ianka Henmelly De Melo Beltrão

Janaína Gonçalves da Silva Melo

RESUMO

Introdução: A relação da planta com finalidade terapêutica se caracteriza a fitoterapia, e esta é uma prática fundamental para prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação de saúde. A utilização da planta *Curcuma longa* L., conhecida entre a população como açafrão da terra, se caracteriza como uma planta que contém compostos ativos como a curcumina, e que apresenta entre seus efeitos terapêuticos diversas propriedades como a anti-inflamatória.

Objetivo: Dessa forma, o vigente estudo teve o objetivo de desenvolver uma formulação tópica a partir da planta, por meio do extrato e incorporar a bases e excipientes de origem vegetal.

Métodos: O trabalho foi experimental pela incorporação das substâncias em diferentes formulações, as amostras foram acondicionadas em recipientes adequados para protegê-las de fatores externos e submetidas a testes de estabilidade. **Resultados:** Com os resultados, a partir dos protótipos foi escolhida a formulação com extrato glicólico à 5% da *Curcuma longa* e excipientes naturais. No qual a composição permaneceu dentro dos limites previstos de estabilidade, assegurando a conformidade com as diretrizes da ANVISA para aplicação na pele.

Conclusão: A *Curcuma longa* L. possui importância e potencial terapêutico, a pomada desenvolvida por ter uma combinação específica de ingredientes e concentrações poderá representar uma formulação promissora na redução de inflamação cutânea, sendo necessário estabelecer testes complementares.

Palavras-chave: Fitoterapia; plantas medicinais; *curcuma longa* L.; ação anti-inflamatória

AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM ÓXIDO DE ETILENO

Maria Eduarda Monteiro De Araújo

Lucas Ermando Ricardo da Silva

RESUMO

Introdução: A esterilização é o processo de eliminar microrganismos a ponto de não serem detectáveis em cultura-padrão. Métodos de esterilização incluem físicos, químicos (como o Óxido de Etileno (ETO) e mecânicos. O óxido de etileno é útil para materiais sensíveis a altas temperaturas, mas é tóxico e responsável pela formação de alguns resíduos que provocam danos à saúde. A validação é crucial para garantir a segurança e a integridade dos materiais após a esterilização por ETO. **Objetivos:** Abordar os procedimentos de controle de qualidade pós-esterilização por óxido de etileno em materiais de origem industrial e hospitalar em uma instituição privada de esterilização. **Métodos:** A pesquisa tem caráter descritivo, quantitativo e laboratorial. O estudo tem características embasadas na descrição do controle de qualidade no processo de esterilização com óxido de etileno. Os dados foram coletados entre os meses de junho a agosto de 2023 por meio de pesquisa interna sobre sua efetividade e esterilidade. **Resultados:** Os resultados indicaram a ausência de resíduos tóxicos, garantindo que o óxido de etileno não ultrapassou o limite estipulado pela Portaria Interministerial nº482, de 16 de abril de 1999. Além disso, o controle microbiológico revelou que todas as amostras estavam livres de microrganismos. **Conclusões:** O estudo com óxido de etileno em materiais hospitalares e industriais obteve resultados altamente satisfatórios. A aeração pós-esterilização manteve resíduos tóxicos dentro de limites aceitáveis. O controle microbiológico ao longo de três meses não detectou microrganismos, garantindo a esterilidade. A pesquisa confirma que a esterilização com óxido de etileno, com aeração adequada e controle microbiológico rigoroso, assegura a segurança e qualidade dos materiais médico-hospitalares, promovendo um ambiente de saúde livre de riscos microbiológicos.

Palavras-chave: Óxido de etileno; esterilização; controle de qualidade; Segurança

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA POTÁVEL UTILIZADA NOS BEBEDOUROS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE RECIFE

Jessica Adriele da Silva

Janaína Gonçalves de Silva Melo

RESUMO

Introdução: A qualidade da água consumida afeta diretamente a saúde da população que a consome e, quando fora dos padrões preconizados, pode veicular contaminantes causadores de doenças. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água e das superfícies dos bebedouros de uma instituição de ensino superior na cidade do Recife. Trata-se de um estudo experimental qualitativo e quantitativo realizado com a água e bebedouros de uma instituição de ensino superior, na cidade do Recife – PE, no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). O material objeto desse estudo foram 15 (quinze) amostras das águas adquiridas de bebedouros e purificadores. Para avaliar a presença de coliformes da água utilizou-se a metodologia de NMP (Números Mais Provável). Além disso, foi feita avaliação microbiológica das partes interna e externa das torneiras pela técnica de amostragem com swab para pesquisas de bactérias heterotrófica aeróbias, bolores e leveduras, para avaliar o potencial transmissor desses organismos nos aparelhos. Os parâmetros para comparação foram obtidos em compêndios oficiais e legislações específicas para água potável no país. Como resultados obteve-se a ausência de coliformes nas 15 amostras analisadas. Quanto a análise dos bebedouros, houve crescimento em todas as amostras, mas por tratar-se de um teste informativo e por falta de informações, a correlação entre frequência de higienização, contaminação e qualidade da água ofertada precisa de maior investigação. Os achados da pesquisa indicam que a água para o consumo ofertada na instituição de ensino se encontra de acordo com os padrões de potabilidade para coliformes.

Palavras-chave: Água potável; qualidade da água; análise microbiológica; coliformes

PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SOBRE GRUPO TUTORIAL INTERPROFISSIONAL NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) DE RECIFE-PE.

Isabela Safira dos Santos

Maria Nelly Sobreira de Carvalho Barreto

RESUMO

As metodologias de ensino na educação superior em saúde devem primar pela formação de profissionais com conhecimentos éticos, técnicos e aptos a atuarem em equipe. E nesse âmbito, a Educação Interprofissional contribui para práticas mais humanizadas e direcionadas para a promoção, recuperação da saúde e ao bem-estar populacional. Trata-se de um estudo analítico de abordagem qualitativa. Desenvolvido entre agosto de 2022 a agosto de 2023 com os estudantes de primeiros períodos dos cursos de: farmácia, fisioterapia, medicina, odontologia, respeitando a resolução nº 510/16 de ética em pesquisa. Os dados foram realizados por meio de análise de Conteúdo de Bardin constituída em etapas. Foram identificadas 5 categorias, sendo essas: o conceito de interprofissionalidade; a dinâmica de grupo tutorial interprofissional; os benefícios do Aprendizagem Baseada em Problemas interprofissional; as dificuldades apresentadas na abordagem da educação interprofissional e a categoria de viabilidade. Mostrando assim aos estudantes novas possibilidades de aprendizagem e sugestões, sendo empregado métodos colaborativos já na grade curricular pedagógica para serem utilizadas no futuro engajamento profissional.

Palavras-chave: Educação interprofissional; aprendizagem baseada em problemas; educação em saúde

FISIOTERAPIA

AValiação DOS GANHOS FUNCIONAIS DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO BASEADA NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE

Cynthia Gonçalves de Oliveira Lima

Marcela Raquel de Oliveira Lima

RESUMO

Cenário: É relevante mensurar os ganhos funcionais, adquiridos através da reabilitação em crianças com diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, pois, permite à equipe, família e usuários definir e acompanhar as estratégias de reabilitação e a evolução dos pacientes. **Objetivo:** Avaliar os ganhos funcionais em crianças acompanhadas num centro de reabilitação, através dos indicadores baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). **Métodos:** Trata-se de um estudo piloto de caráter descritivo e retrospectivo, desenvolvido no Centro Especializado em Reabilitação do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (CER IV-IMIP), envolvendo crianças acompanhadas no serviço de fisioterapia da área da reabilitação física. A coleta dos dados foi realizada através de informações contidas nos prontuários utilizando-se a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e comparando os qualificadores atribuídos na admissão e na alta. **Resultados:** A amostra foi de 16 crianças. Em relação ao controle cervical, 75% das crianças apresentaram ausência de problema, 25% das crianças possuíam deficiência leve ou moderada na avaliação de admissão. No marcador permanecer sentado 56,25% das crianças apresentaram ausência do problema, enquanto 37,5% apresentaram alguma deficiência entre leve a completa e 6,25% receberam o qualificador 9, ou seja, não se aplica. Cerca de metade das crianças (56,25%) apresentaram deficiência entre leve à completa para o marcador de andar curtas distâncias. Sobre o marcador deslocar-se observou-se que apenas 25% das crianças apresentaram ausência de problema nessa função no momento da admissão. **Conclusão:** Todas as crianças acompanhadas, obtiveram uma melhora funcional em pelo menos 2 dos marcadores da CIF, pois apesar do diagnóstico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, foi traçado um plano terapêutico da área da fisioterapia motora, facilitando o acompanhamento e a evolução da criança em relação ao tratamento fisioterapêutico no momento da alta.

Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade; incapacidade e Saúde; criança; reabilitação

QUALIDADE DE VIDA E GRAVIDADE DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA EM MULHERES ATENDIDAS NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP) NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE.

Bruna Ribeiro de Almeida

Julianna Guendler

RESUMO

Objetivo: avaliar a gravidade da incontinência urinária de urgência (IUU) e o impacto na qualidade de vida (QV) das pacientes. **Método:** trata-se de um estudo transversal realizado em um ambulatório de fisioterapia de saúde da mulher na região metropolitana do Recife, durante o período de janeiro a maio de 2023. Foram usados questionários estruturados através do google forms para avaliar a gravidade e o impacto da incontinência urinária (IU) na QV. **Resultados:** foram avaliadas 51 mulheres com idade média de 51,39 (\pm 11,93) anos, índice de massa corpórea (IMC) de 30,9 (\pm 6,3) kg/m², 74,5% apresentaram IU mista (n = 38) e 25,49% IUU (n = 13). Todas as voluntárias (n = 51) relatam episódios de noctúria, com média de 3,13 (\pm 1,31) despertares noturnos para ir ao banheiro, já 43,13% (n = 22) relatam enurese noturna. A gravidade da IU foi categorizada como leve em 5,88% (n = 03), moderada em 19,6% (n = 10), grave em 39,21% (n = 20) e muito grave em 35,29% (n = 18) das pacientes e a maior parte da amostra apresentou impacto muito grave na QV (96,07%) em decorrência da IU. **Conclusão:** foi demonstrado elevado índice de noctúria em pacientes com IUU e que a maior parte apresenta IU grave ou muito grave. Também foi observado que a IUU representa impacto muito grave na QV.

Palavras-chave: Incontinência urinária; incontinência urinária de urgência, qualidade de vida noturna

A PERCEPÇÃO DE RESIDENTES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERPROFISSIONAIS DURANTE VIVÊNCIA DE PRÁTICA INTERDISCIPLINAR EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Letícia de Souza Cavalcanti

Marina Alves Caminha

RESUMO

Objetivo: Analisar a percepção de um grupo de residentes da área de saúde acerca do desenvolvimento de competências interprofissionais durante vivência de prática interdisciplinar em um Centro Especializado em Reabilitação (CER). **Método:** Estudo qualitativo transversal de caráter exploratório, cujo instrumento para coleta de dados se deu por meio de entrevista de grupo focal (GF), que foi audiogravada e transcrita. Teve a participação dos residentes que realizaram prática no Programa de Estimulação Precoce (PEP) no CER de um hospital escola referência no Estado de Pernambuco. Os dados foram analisados mediante a análise de conteúdo, segundo Minayo. **Resultados:** A partir da análise qualitativa dos relatos do GF, foi possível observar a dicotomia entre práticas multi e interprofissionais e entre os modelos de cuidado colocados em prática pelo PEP. Destaca-se que a falta de planejamento e sistematização de reuniões em equipe foi uma importante barreira enfrentada pelo grupo. No entanto, o estudo aponta para o desenvolvimento de uma nova identidade profissional entre o grupo de residentes que passa a compreender a importância de aprender a partir de, com e para o outro. **Conclusão:** O estudo sugere que o PEP, enquanto cenário de aprendizado e prática profissional, se melhor estruturado e planejado, pode contribuir de maneira satisfatória ao desenvolvimento de competências interprofissionais.

Palavras-chave: Educação em saúde; educação interprofissional; educação baseada em competências; práticas interdisciplinares; modelos de assistência à saúde

FUNCIONALIDADE DE PACIENTES TRÊS ANOS APÓS A ALTA HOSPITALAR PELA COVID-19

Emilly Gabrielly Santana Vasconcelos

Lívia Barboza de Andrade

RESUMO

Introdução: A COVID-19 gera inúmeras complicações sistêmicas no organismo, sendo o sistema respiratório e o muscular os mais afetados, impactando negativamente na qualidade de vida dos acometidos pelo vírus. Indicando a necessidade de um acompanhamento, foi criada a Escala de Estado Funcional Pós-COVID-19 (PCFS), uma escala simples, que tem como objetivo monitorar a permanência de sintomas e seu impacto no estado funcional dos pacientes pós-COVID-19 com base nas suas limitações nas tarefas e atividades diárias. **Objetivo:** Analisar a funcionalidade de pacientes três anos após a alta hospitalar pela COVID-19. **Métodos:** Trata-se de um estudo de seguimento observacional, atrelado a um mestrado profissional em cuidados intensivos associado à residência em saúde do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. Foi realizado com dados de pacientes que foram internados no Hospital Público de Enfrentamento da COVID-19 (Hospital Provisório do Recife-2). A coleta de dados foi referente ao período de março a maio de 2023. A população do estudo foi constituída pelos pacientes que foram internados no ano de 2020 com a confirmação do diagnóstico de COVID-19 por teste RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction) e que apresentavam idade superior a 18 anos. A entrevista foi realizada por telefone e os dados foram coletados pelos pesquisadores integrantes do estudo através de uma escala de funcionalidade, traduzida para a população brasileira: a PCFS, por meio de um formulário no programa Google Forms. **Resultados:** Foram elegíveis 89 pacientes, mas apenas 35 participaram da pesquisa, com idade média de 64 anos e que passaram cerca de 17 dias internados. Com relação a avaliação da funcionalidade por meio da escala PCFS, foi observado uma variação entre grau 0 (nenhuma limitação) e grau 2 (limitação leve). **Conclusão:** Três anos após a infecção por COVID-19, grande parte dos pacientes ainda apresentam algum tipo de limitação funcional. Destaca-se a importância da avaliação contínua para melhor entendimento dos efeitos a longo prazo da COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19; estado funcional

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE VÍDEO EDUCATIVO PARA PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA

Maria Eduarda Santos de Luna

Renata Carneiro Firmo

RESUMO

Introdução: A cirurgia de retirada do câncer de mama apresenta algumas complicações como dor, redução da amplitude de movimento, edema. Estes associados a falta de orientações pelos profissionais de saúde, levam muitas mulheres a apresentar dificuldades importantes nas suas atividades de vida diária e no retorno ao trabalho. Para amenizar os prejuízos é necessário assegurar a mulher informações da cirurgia e do pós-operatório e, para isso, é possível utilizar recursos audiovisuais como estratégia. **Objetivo:** Construir e validar um material para elaboração de vídeo educativo, destinado às mulheres no pós-operatório de mastectomia, com a intenção de orientá-las no autocuidado e na manutenção dos movimentos no pós-operatório. **Métodos:** Estudo metodológico de construção e validação de conteúdo para elaboração de vídeo educativo, desenvolvido em duas etapas, análise e modelagem. A construção ocorreu por meio de entrevistas com mastectomizadas atendidas no ambulatório de fisioterapia em saúde da mulher do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e na etapa de pré-produção, foi baseada em uma das três fases propostas por Fleming. A validação do recurso educativo foi realizada por técnicos e juízes de conteúdo. **Resultados:** 38 entrevistas foram realizadas e, na visão dos envolvidos, 03 temas foram identificados: orientações, recuperação e formato de orientação. A primeira versão do roteiro teve 07 blocos e mesmo após a validação, esse número foi mantido. **Conclusões:** O material proposto para elaboração de vídeo educativo mostrou-se válido em aparência e conteúdo, apresentando potencial para mediar práticas educativas em ambiente hospitalar, ambulatorial e domiciliar.

Palavras-chave: Cuidados pós-operatórios; mastectomia radical; linfedema pós-mastectomia; fisioterapia; vídeos educativos

MEDICINA

PERFIL DO TUTOR E DESEMPENHO DO ESTUDANTE EM TUTORIA REMOTA DURANTE A PANDEMIA PELA COVID-19.

Isadora Ayres de Melo Coelho da Costa

Ana Rodrigues Falbo

RESUMO

Introdução: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia decorrente da doença Covid-19, esse novo cenário, impôs mudanças nos processos de aprendizagem. Avaliar a percepção do estudante sobre a atuação do tutor nesse contexto de mudanças e adversidades, pode contribuir para a elaboração de estratégias de treinamento ao docente para que não haja prejuízo da aprendizagem mesmo em condições adversas. **Objetivo:** avaliar a percepção do estudante sobre o perfil do tutor, segundo os princípios educacionais fundamentais da Aprendizagem Baseada em Problemas, e considerando o contexto do ambiente remoto de aprendizagem e da pandemia pelo SARS- CoV2. **Métodos:** realizado estudo de corte transversal na Faculdade Pernambucana de Saúde, entre setembro de 2021 a setembro de 2023, envolvendo estudantes de medicina. Utilizado Questionário Breve de Avaliação do Tutor, contendo 15 itens que se agrupam em cinco dimensões correspondendo aos pressupostos das aprendizagens: colaborativa, construtiva, contextual e autodirigida. A análise do instrumento foi feita pelas médias aritméticas do seu conjunto de itens, compondo o escore médio geral e por dimensão. Atribuiu-se grau percepção dos estudantes sobre as características do tutor, considerando-se os pontos de corte: ausência de percepção ($\leq 3,0$); boa percepção ($>3,0$ a $< 4,0$); e ótima percepção ($> 4,0$ a $5,0$). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob o CAAE: 1 50458621.0.0000.5569 e Número do Parecer: 4.934.320. **Resultados:** os estudantes apresentaram ótima percepção das características dos tipos de aprendizagem avaliadas pelo escore médio geral (4,15), o que correspondeu a 74,2% das avaliações. A média da pontuação global do tutor dada ao final foi de 8,46, considerada suficiente. Considerando os escores médios por dimensão: aprendizagem construtiva 4,21, aprendizagem autodirigida 4,11, aprendizagem contextualizada 4,20, aprendizagem colaborativa 4,01, e o comportamento interpessoal do tutor 4,01. Todos indicando ótima percepção das características correspondentes. As respostas ao instrumento se mostraram confiáveis (alfa de Cronbach=0,92). **Conclusões:** o estudo apontou, a despeito das condições adversas, considerando a mudança para o ambiente remoto de aprendizagem e a pandemia pelo SARS-

CoV2 que os estudantes foram capazes de perceber as características condizentes com os princípios educacionais fundamentais da ABP nos tutores.

Palavras-chave: estudante; aprendizagem baseada em problemas; grupo tutorial; educação em saúde; Covid-19; educação à distância

SITUAÇÃO DA COBERTURA VACINAL E HPV EM ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL

João Victor Melo Mangueira

Ariani Impieri de Souza

RESUMO

Introdução: Avaliar a cobertura vacinal geral e, especialmente, contra HPV (Papilomavírus humano), bem como os fatores associados a esta cobertura entre estudantes de uma faculdade da área de saúde. **Método:** foi realizado um estudo de corte transversal com 393 estudantes com idade de 18 anos ou mais, de todos os cursos de saúde de uma faculdade na área de saúde. As informações foram coletadas por entrevistas. Foram analisadas variáveis socioepidemiológicas e do calendário vacinal dos participantes. Foram construídas tabelas de distribuição de frequência e associação entre as variáveis de interesse. Foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, considerando $p < 0,05$. **Resultados:** a maioria dos 393 alunos tinha idade entre 18 e 23 anos (87,8%), com média de 21 (DP: 2,3) anos e 77,9% eram mulheres. Quase a metade (41,0%) estava no primeiro ano do curso. Houve associação entre tomar a vacina do HPV e menor faixa etária ($p=0,003$), sexo feminino ($p=0,003$) e acadêmicos de outros cursos que não medicina ($p=0,001$). Observou-se ainda associação estatisticamente significativa entre conhecer as doenças preveníveis pela vacina e o sexo feminino ($p = 0,036$) e entre os diferentes cursos ($p < 0,001$). O curso de medicina apresentou o maior percentual (70,8%) de conhecimento sobre a vacina do HPV, seguida do curso de enfermagem (63,0%). **Conclusão:** as taxas de vacinação encontradas no presente estudo ainda estão aquém do preconizado. O conhecimento não está relacionado à quantidade de períodos concluídos. O curso de medicina foi o que se destacou em conhecimentos sobre o assunto, porém, ficou com a menor taxa vacinal de HPV.

Palavras-chave: papilomavírus humano; vacina quadrivalente recombinante; prevenção neoplasias do colo do útero

FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE COLOPROCTOPATIA ACTÍNICA CRÔNICA E RESPOSTA À ABLAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO EM PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO TRATADAS COM RADIOTERAPIA PÉLVICA NO IMIP

Beatriz Ximenes Bandeira de Morais

Ariani Impieri de Souza

RESUMO

Introdução: câncer de colo de útero (CCU), um dos tipos de câncer mais comum entre mulheres no mundo, quando localmente avançado, tem como tratamento a radioterapia isolada ou associada à quimioterapia. Entre as complicações da radioterapia, tem sido observado a coloproctopatia actínica (CPA). Apesar de se tratar de uma complicação conhecida, a literatura é escassa quanto a incidência desses sintomas e possíveis fatores associados. **Objetivos:** analisar fatores associados ao desenvolvimento de CPA e a resposta ao tratamento com plasma de argônio (APA) em pacientes com câncer de colo do útero. **Método:** foi realizado um estudo de corte transversal com análise de dados secundária de um estudo prévio com mulheres com CCU atendidas no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017. A amostra foi composta por 226 pacientes. Foram analisadas variáveis sociodemográficas, relacionadas a hábitos de vida, e variáveis clínicas e variáveis relacionadas ao câncer e ao tratamento. Foram calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis e a associação entre as variáveis foi realizada com o teste qui-quadrado de Pearson, adotando um nível de significância de 5%. O estudo original foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas do IMIP (CAAE: 50034821.1.0000.5201). **Resultados:** entre as 226 pacientes analisadas 87 (38,5%) apresentaram sintomas de CPA, caracterizado por sangramento retal. Dessas, 59 realizaram colonoscopia diagnóstica sendo confirmada a CPA em 58, representando frequência 25,6%. Entre os fatores associados aos sintomas de CPA, evidenciou-se associações estatisticamente significativas com: braquiterapia ($p < 0,001$), dose acumulada de radioterapia maior ou igual a 7.000cGy ($p < 0,001$) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) ($p = 0,036$). Foi observado que nenhuma mulher com dose de radioterapia pélvica < 4.500 cGy apresentou sintomas de CPA. O tempo médio decorrido entre o término da radioterapia e o primeiro sintoma da CPA foi entre 6 e 12 meses, em 48,3% mulheres. Onze pacientes (19%) necessitaram de hemotransfusão em decorrência do sangramento. Entre as 58 mulheres que confirmaram a CPA, 38 (65,5%) realizaram tratamento com APA, sendo que quase a metade (44,8%) realizou apenas 1 sessão e houve ausência de sangramento pós-tratamento em 22 das

38 que fizeram APA (57,9%). **Conclusão:** evidenciou-se a elevada frequência de CPA na amostra analisada, refletindo no perfil populacional local. Foi observado associação entre a presença de sintomas de CPA e o tratamento com radioterapia pélvica, com ou sem braquiterapia, utilizando dose maior ou igual a 4.500cGy, HAS associada e doses acumuladas de radioterapia superiores a 7.000cGy.

Palavras-chave: neoplasias do colo do útero; radioterapia; proctite

ANÁLISE DA SOBREVIDA DO ENXERTO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE RENAL

Anna Clara de Moura Lima

Emilia Maria Dantas Soeiro

RESUMO

Introdução: O transplante renal é a terapia padrão ouro para doença renal crônica em estágio final. Entretanto, aspectos relacionados às características do doador, do receptor, à técnica cirúrgica, ao protocolo de imunossupressão, e comorbidades parecem impactar na sobrevida do enxerto. **Objetivo:** Avaliar os fatores associados à sobrevida do enxerto em pacientes pediátricos submetidos ao transplante renal. **Métodos:** Estudo descritivo do tipo coorte retrospectivo, que incluiu todos os pacientes de 1 a 18 anos submetidos ao transplante renal na Unidade Renal Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife - Brasil, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2021, somando um total de 51 pacientes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IMIP sob o número CAAE: 52023921.1.0000.5201. **Resultados:** A mediana de idade dos pacientes ao transplante renal foi de 12 anos (9 -13), sendo 27 (52,9%) do sexo masculino e 8 (15,6%) menores de 5 anos. As taxas de sobrevida do enxerto e do paciente, avaliadas através da Curva de Kaplan Meir, foram respectivamente 86,3% e 90,2%. Sete pacientes perderam o enxerto, sendo a causa mais frequente a trombose de veia renal (n=5). As causas não glomerulares de DRC, mostraram menor sobrevida do enxerto, quando comparada às causas glomerulares (Log Rank p=0,035). Além disso, 58% da população era hipertensa, enquanto que 80,4% apresentava dislipidemia. **Conclusão:** As taxas de sobrevida do enxerto e dos pacientes na nossa casuística se assemelham aos dados nacionais e mundiais. As causas mais frequentes de perda do enxerto foram os eventos tromboembólicos. Além disso, observamos elevada prevalência de hipertensão e dislipidemia. Esses resultados nos direcionam a estabelecer estratégias para melhorar a sobrevida dos transplantes renais pediátricos.

Palavras-chave: pediatria; transplante de Rim; insuficiência renal crônica; análise sobrevida

ESTUDO QUANTITATIVO E COMPARATIVO DA BASE SEMIOLÓGICA ENTRE ESTUDANTES DO CICLO CLÍNICO DA FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE AFETADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19

Jorge Luiz Cerqueira de Gusmão Filho

Márcia Lins Cirne de Azevêdo

RESUMO

Introdução: A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo no processo de formação médica, levando à substituição das aulas presenciais por ensino remoto. Houve adaptação das instituições de ensino, surgindo desafios como falta de capacitação tecnológica e maior centralização do ensino no docente, o que levantou preocupações sobre a formação dos futuros profissionais de saúde. **Objetivos:** O objetivo foi avaliar a aplicação teórico-prática da semiologia dos aparelhos cardiovascular e respiratório nas turmas de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), investigando o déficit apresentado durante e após a pandemia do Covid-19, bem como a influência do ambulatório de ensino e de práticas extracurriculares para melhores resultados. **Métodos:** Realizou-se a aplicação de dois questionários, um de natureza teórica e outro de natureza prática sobre a semiologia dos aparelhos cardiovascular e respiratório, para estudantes da FPS com entrada de 2019.1 a 2020.2, sendo a amostra por conveniência. A análise dos dados foi seguida de etapas: tabulação dos dados, análise de acertos e da aplicação prática da semiologia nos ambulatórios de ensino e confrontação de dados entre os questionários. **Resultados:** Identificamos déficit significativo quanto a semiologia do aparelho respiratório, onde foram apresentadas as piores taxas de acertos, e dificuldades quanto ao aparelho cardiovascular, levando a desconhecimentos que impactam na análise crítica do futuro profissional médico. Ainda foi evidente as maiores dificuldades em estudantes veteranos frente a estudantes com menos tempo de curso, sugerindo uma menor influência do ambulatório de ensino na correção do déficit inicialmente apresentado. Além disso, notou-se que as presenças de atividades extracurriculares impactam de forma positiva no rendimento dos estudantes, tendo em vista a presença de melhores resultados quando comparados com participantes que seguiram apenas o cronograma da FPS. **Conclusões:** Foram evidenciadas deficiências importantes na semiologia dos aparelhos orgânicos avaliados, especialmente para turmas veteranas. Ficou claro a influência benéfica de atividades extracurriculares para aprimoramento teórico e prático da semiologia médica. Novos estudos podem avaliar os impactos profissionais do corte desta pesquisa, indicar a eficiência das atividades

extracurriculares na redução do déficit apresentado e estimar a real influência do ambulatório de ensino no processo.

Palavras-chave: Avaliação Educacional; exame físico; COVID-19

PERFIL DOS CASOS NOTIFICADOS DE MENINGITE BACTERIANA NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA EM PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2011 A 2020

Camila Nogueira Coutinho

Alberto de Barros Lima Filho

RESUMO

Introdução: Compreender o perfil epidemiológico dos casos notificados de meningite bacteriana em crianças de 0 a 19 anos no estado de Pernambuco, entre 2011 a 2020. **Método:** Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de abordagem quantitativa. **Resultados:** A amostra foi composta por 1253 casos confirmados. O maior número absoluto de casos/ano foi em 2011 com 225 registros. Quanto às características sociodemográficas, 59,54% dos acometidos foram do sexo masculino, sendo os menores de 5 anos (43,74%) e residentes na Região Metropolitana de Recife (36,71%) os mais frequentes. Sobre os desfechos, 1025 pacientes (81,8%) receberam alta por melhora clínica. A meningite causada por outras bactérias (56,34) obteve o maior registro. No tocante ao critério de confirmação, a maioria foi confirmado pelo exame quimiocitológico do líquido (42,62%). Grande parte dos casos (80,13%) não relatou contato prévio com doentes e sobre doenças pré-existentes e vacinação prévia, os dados fornecidos não trouxeram resultado significativo, pois 89,62% e 72,63% das informações, respectivamente, tiveram o campo ignorado. **Conclusão:** Houve redução na incidência nos últimos 10 anos, mantendo o padrão de acometimento em crianças menores de 5 anos conforme encontrado na literatura. A vacinação teve grande importância nesse contexto, mostrando a necessidade de manter a cobertura vacinal nos níveis aceitáveis.

Palavras-chave: Meningites bacterianas; epidemiologia; crianças

O EFEITO DA CABERGOLINA SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Camilla Katarine Delgado Andrade

Flávio Xavier da Silva

RESUMO

Determinar a ação da cabergolina para inibição da lactação sobre a pressão arterial em puérperas. Método: Foi realizado um ensaio clínico randomizado, comparando a cabergolina com medidas físicas (enfaixamento das mamas e crioterapia) para inibição da lactação, em um hospital de referência no Recife – PE. Um banco de dados já coletado em um formulário eletrônico do banco de dados online REDCap (Research Electronic Data Capture) foi utilizado para o estudo atual. Resultado: Não houve alteração da pressão arterial após o uso da cabergolina. Em torno de 95% das mulheres alocadas no grupo cabergolina apresentaram alguns efeitos adversos considerados leves. Os efeitos adversos mais prevalentes decorrentes do uso da cabergolina foram dor epigástrica, náusea e vômito. Conclusão: A cabergolina, utilizada para inibição da lactação, não alterou a pressão arterial. Observamos muitos efeitos adversos leves com o uso da cabergolina, mas que não comprometeram o seu uso.

Palavras-chave: supressão da lactação; gravidez; parto; puerpério; tratamento farmacológico

PADRÃO DE GRAVIDADE DA COVID-19 E DESFECHO ÓBITO CONFORME PERFIL VACINAL ENTRE PACIENTES COM RT-PCR POSITIVO NO HOSPITAL ALFA, RECIFE-PE

João Victor Nascimento Leite

José Roberto da Silva Junior

RESUMO

Objetivo: Descrever o padrão de gravidade e desfecho óbito de acordo com o perfil vacinal entre pacientes com RT-PCR positivo atendidos no Hospital Alfa, Recife- PE. **Métodos:** Foi realizado um estudo epidemiológico, do tipo observacional, transversal, retrospectivo e prospectivo, realizado a partir de dados secundários de exames de RT-PCR, de notificação de casos da COVID-19, de internações, de óbitos e de registros da vacinação no estado de Pernambuco. A população do estudo será composta por pacientes atendidos no hospital Alfa que tiveram o RT-PCR positivo para o SARS-COV-2 assistidos no período de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, com idade igual ou superior a 18 anos. Para o estudo, foram consideradas variáveis sociodemográficas; estilo de vida e estado nutricional; quadro clínico; sinais vitais; necessidade de suporte ventilatório e exames; caracterização da COVID-19. **Resultados:** Dos 1.921 pacientes incluídos no estudo, 996 (50,8%) fizeram uso da vacina, nesses pacientes, nota-se uma necessidade menor de intervenções médicas para suporte respiratório, sendo necessário uso de ventilação mecânica invasiva em cerca de 34% dos pacientes vacinados e, nos não vacinados, o uso do mesmo recurso chegou a aproximadamente 57%. Ademais, a taxa de mortalidade em ambiente intra-hospitalar foi de 37,4% nos pacientes imunizados, enquanto que no grupo não imunizado e que teve teste de RT-PCR para o SARS-CoV-2, a taxa de mortalidade intra-hospitalar foi equivalente a 60,8%. ; **Conclusão:** Este estudo realizado mostrou que as vacinas contra o SARS-CoV-2 foram efetivas na redução da gravidade da doença e dos óbitos mesmo em pacientes internados com COVID-19, os quais geralmente apresentam doença mais grave, com maiores taxas de mortalidade, causando mais gastos para o sistema de saúde. Palavras-chave: Infecção por Coronavírus; epidemiologia; perfil vacinal; óbito.

Palavras-chave: epidemiologia; perfil vacinal; óbito; infecção por coronavírus

IMPORTÂNCIA DA TEMPESTADE DE IDEIAS PARA A MOTIVAÇÃO DO ESTUDO DIRIGIDO NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

Lysa Souza Freitas

Ana Rodrigues Falbo

RESUMO

Introdução: a Aprendizagem Baseada em Problemas, aprendizagem centrada no estudante, se utiliza de problemas para estimular a discussão em pequenos grupos, os grupos tutoriais. A tempestade de ideias, passo 3 do desenvolvimento do grupo tutorial, é uma etapa primordial para ativar o conhecimento prévio, estabelecendo um processo ativo de construção e reconstrução do conhecimento, constituindo a aprendizagem significativa. **Objetivo:** avaliar o cumprimento da tempestade de ideias e sua correlação com o tempo despendido e a motivação para a realização do estudo dirigido. **Métodos:** estudo corte transversal, envolvendo estudantes de medicina, na Faculdade Pernambucana de Saúde, no período entre setembro de 2022 a setembro de 2023. Para avaliar o cumprimento da tempestade de ideias foi utilizada escala elaborada e validada previamente. A análise desse instrumento foi feita por meio da média aritmética do conjunto dos itens avaliados, levando-se em conta o escore médio (EM) foram considerados os pontos de corte: cumprimento inadequado do passo ($EM \leq 3,0$), cumprimento regular ($EM > 3,0$ e $< 3,5$), cumprimento bom ($EM = 3,5$ a $\leq 4,0$) e cumprimento ótimo ($EM > 4,0$). Para a avaliação da motivação intrínseca foi utilizado o Inventário de Motivação Intrínseca, sua análise foi feita por meio do cálculo da média aritmética dos 45 itens, compondo o escore médio geral (EMG). Foram definidos os pontos de corte: $\leq 3,0$ (não verdadeiro/não motivado), $> 3,0$ e $< 6,0$ (algo verdadeiro/motivado) e $\geq 6,0$ (muito verdadeiro/muito motivado). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Pernambucana de Saúde. CAAE: 50408021.7.0000.5569. **Resultados:** o cumprimento da tempestade de ideias foi considerado ótimo ($EMG = 4,35$), no geral, correspondendo a 73,9% das avaliações e quando observado cada item do instrumento. Em relação à motivação para o estudo dirigido foi observado que os estudantes se encontravam motivados ($EMG = 3,73$). Foram observadas correlações entre a tempestade de ideias e a motivação no geral e nas subescalas 1,2 e 6 (Interesse e prazer, competência percebida e valor/utilidade), apesar de fracas ($r < 0,5$). **Conclusão:** na avaliação dos estudantes as etapas para a realização da tempestade de ideias foram cumpridas de forma satisfatória e eles estavam motivados para a realização do estudo dirigido.

Palavras-chave: aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem ativa; aprendizagem colaborativa; motivação.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PSQUIATRAS E RESIDENTES MÉDICOS EM PSIQUIATRIA QUE UTILIZAM A TELEPSIQUIATRIA NO BRASIL

Maria Danise Rodrigues Aguiar

Maria De Fátima Costa Caminha

RESUMO

Introdução: Caracterizar o perfil sociodemográfico, formação e atuação dos psiquiatras e residentes médicos em psiquiatria que utilizam a telepsiquiatria no Brasil. **Métodos:** Pesquisa quantitativa, descritiva e transversal realizada através das redes sociais e divulgação no site da Associação Brasileira de Psiquiatria de link para o questionário no Google Forms. A coleta de dados foi de junho de 2022 a março de 2023. As variáveis do estudo foram apresentadas através da distribuição de frequência simples e relativa. **Resultados:** Obtidas 101 respostas. Prevaleram a idade de 36 anos ou mais (62,4%), o sexo feminino (60,4%), residir (82%) e trabalhar em capitais (59,4%), tempo de formação entre 10 e 20 anos (40%), residência médica (57%), não docentes (71%), não ter acesso a bases de dados (66%), participar de congressos (91%) e não ter treinamento em telemedicina (87,1%). **Conclusão:** A baixa porcentagem de psiquiatras atuantes no interior dos estados e, principalmente, a falta de treinamento formal em telemedicina podem gerar questionamentos sobre o acesso à saúde e à própria tecnologia.

Palavras-chave: Psiquiatria; telemedicina; telepsiquiatria

RESISTÊNCIA AO TENOFOVIR E EMTRICITABINA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV-1, EM FALHA VIROLÓGICA, NO MARANHÃO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS MUTAÇÕES DE RESISTÊNCIA DO HIV-1 NAS MEDICAÇÕES UTILIZADAS PARA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO

Matheus Alexandre Sobral Batista

Kledoaldo Oliveira de Lima

RESUMO

Introdução: determinar a frequência da resistência antirretroviral e das mutações primárias ao Tenofovir Disoproxil Furamato e a Emtricitabina, e realizar inferência filogenética em pessoas vivendo com HIV-1 que apresentam falha virológica, no estado do Maranhão no período correspondente aos anos 2008 a 2021. **Métodos:** Consiste em um estudo de caráter transversal do tipo analítico que faz parte do projeto âncora intitulado “Análise do perfil genótipo de pacientes com falha terapêutica à anti-retrovirais no estado do Maranhão”. **Resultados:** De um conjunto de 339 amostras de sangue submetidas à análise de sequenciamento genético para avaliar a resistência aos antirretrovirais TDF e FTC, 264 (77,9%) apresentaram perfil de resistência ao TDF e/ou FTC. As maiores taxas de resistência foram observadas em relação ao FTC, atingindo 266 (66,7%) pacientes, enquanto a resistência ao TDF foi registrada em 37 (10,9%) pacientes. Além disso, aproximadamente 23 (6,8%) das amostras apresentaram resistência tanto ao TDF quanto ao FTC **Conclusão:** O subtipo B apresentou maior expressão, representando 86,2%, entre as 339 amostras, tanto nos casos de resistência ao TDF quanto ao FTC. O sexo masculino foi predominantemente infectado pelo HIV-1, representando uma taxa de 62,8%. A frequência de indivíduos do sexo masculino vivendo com HIV/AIDS também foi maior na classe de resistência TDF e na classe de resistência FTC. **Palavras-chave:** HIV; fármacos anti-HIV; síndrome da imunodeficiência adquirida; profilaxia pré-exposição; aplicações da epidemiologia

CARTILHA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS: UM GUIA PARA UMA COMUNICAÇÃO EFETIVA E O BEM ESTAR DO NÚCLEO PACIENTE-CUIDADORES.

Ana Gabriela de Siqueira Guedes
Pedro Paulo Procópio de Oliveira Santos

RESUMO

Introdução: Cuidados Paliativos é uma forma de assistência focada na abordagem integral ao paciente e focada na melhora de sua qualidade de vida. Entretanto, ainda é pouco compreendida pela população geral, sobretudo no âmbito pediátrico, havendo uma compreensão equívoca de que significa morte iminente ou o adiamento de tal. Desse modo, um instrumento que esclareça tais conceitos é necessário para que pacientes e familiares usufruam dos benefícios que essa prática oferece. **Objetivos:** Elaborar e validar uma cartilha educativa para promover o entendimento a respeito dos Cuidados Paliativos Pediátricos, de modo a facilitar a comunicação entre profissionais de saúde e o núcleo cuidadores-paciente. **Métodos:** Estudo de elaboração e validação de um produto técnico, voltado para pacientes e cuidadores. A validação foi feita meio de um questionário respondido por profissionais da área de saúde e realizada entre Janeiro e Setembro de 2023. Os participantes avaliaram a cartilha considerando uma escala tipo Likert de quatro pontos, sendo calculado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC). O IVC considerado adequado foi de $\geq 0,80$. Resultados: Dentre os 20 participantes, 12 são médicos (60%), 5 enfermeiras (25%) e 3 fisioterapeutas (15%). Após a análise dos dados, foi obtido um valor de $IVC = 0,96$. **Conclusão:** A cartilha mostrou-se válida e apta para uso prático.

Palavras-chave: comunicação em saúde; cuidados paliativos; medicina paliativa; pediatria

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DA INFECÇÃO POR COVID-19 EM ESTUDANTES INTERNOS DE UMA FACULDADE DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Larissa Inácio Pereira Nunes
Tereza Rebecca de Melo e Lima

RESUMO

Introdução: Analisar o perfil clínico e epidemiológico da infecção por COVID-19 nos estudantes internos de uma Faculdade de Saúde de Pernambuco. **Métodos:** estudo descritivo do tipo corte transversal com internos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) que praticaram, na pandemia, estágio curricular obrigatório supervisionado entre agosto de 2022 a agosto de 2023. Os estudantes foram contactados por WhatsApp e E-mail para a coleta de dados por meio de formulário eletrônico. Foram analisadas características sociodemográficas, relacionadas ao quadro clínico em estudantes acometidos pelo COVID-19, ao internato médico na pandemia e à vacinação. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas. CAAE: 62595721.6.0000.5201. **Resultados:** Foram analisados os dados de 201 internos de medicina com idade média de 24,43 anos. 90,2% afirmaram que a pandemia atrapalhou o desempenho no internato. 50% afirmaram terem se deparado, durante as práticas acadêmicas, com Equipamento de Proteção Individual (EPI) inadequado ou ausente. A maioria (65,8%) referiu ter adoecido devido a COVID-19 no internato, porém 89% relataram ter tido quadro leve. 95% dos internos relataram ter tomado a vacina contra COVID-19. A maioria (97,9%) declarou confiar nas vacinas oferecidas. **Conclusões:** A pandemia do COVID-19 trouxe impactos negativos para os estudantes do internato médico da FPS. Dentre eles, destaca-se a insegurança no ambiente de trabalho, a diminuição no número de práticas e a suspensão das atividades. Apesar da alta prevalência de infecção entre os internos, a maioria teve casos leves, evidenciando a importância da vacinação para prevenção de casos graves.

Palavras-chave: COVID-19; pandemia; internato médico

AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ASA-PS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE OS ANESTESIOLOGISTAS DO IMIP

Gabriella Malta de Andrade

Luciana Cavalcanti Lima

RESUMO

Introdução: Analisar a concordância entre os anesthesiologistas que realizam anestesia pediátrica do IMIP sobre o uso do Sistema de Classificação ASA-PS após atualização em 2020, correlacionando com idade, tempo de experiência como anestesista e frequência de trabalho com anestesia pediátrica. **Método:** Foi realizado um corte transversal por questionário contendo 10 casos fictícios para a classificação do ASA pelos participantes, excetuando-se o ASA VI. Validaram-se os cenários por uma equipe de cinco anesthesiologistas pediátricos experientes do IMIP antes da aplicação entre os demais profissionais do setor. **Resultados:** Foram incluídos 40 participantes na pesquisa, dentre os quais 28 (70%) possuíam entre 30 e 40 anos. Quanto ao tempo de atividade, 18 (45%) possuíam menos de 5 anos e 13 (32,5%) tinham entre 5 e 10 anos. Com relação à frequência de atividade com anestesia pediátrica, 18 (45%) atuavam um dia/semana. Observou-se uma média de acertos de 6.75. **Conclusão:** Percebeu-se que o ASA-PS é uma ferramenta de uso diário dos anesthesiologistas pediátricos para avaliação do risco perioperatório e observou-se uma significativa concordância na sua aplicação entre os profissionais do IMIP. Ademais, notou-se a inexistência de correlação entre idade dos anestesistas, tempo de trabalho com anestesia e frequência de atividade com anestesia pediátrica e a média de acertos da classificação ASA-PS das crianças.

Palavras-chave: Anestesia; saúde pediátrica; cuidados perioperatórios; ASA score; ASA Physical Scale

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM CIRROSE ALCOÓLICA EM AMBULATÓRIO DE HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO

Paula Lira da Cunha

Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa

RESUMO

Introdução: Analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com cirrose alcoólica em um hospital de referência do Recife. **Método:** Estudo descritivo e observacional, do tipo transversal, realizado a partir da consulta de prontuários e entrevistas com os pacientes do ambulatório de hepatologia de um hospital de referência em Pernambuco nos anos de 2022 e 2023. Para inclusão na amostra, foram considerados indivíduos acima de 18 anos, diagnosticados com cirrose alcoólica e acompanhados regularmente no serviço. Foram excluídos aqueles com cirrose decorrente de outra morbidade de base exclusivamente não alcoólica. **Resultados:** Foram incluídos 41 participantes, destes, 73,17% eram do sexo masculino. A faixa etária mais prevalente foi entre 41-50 anos com 31,71%. Em relação à procedência, 53,66% foram da Região Metropolitana do Recife. Dos participantes, 56,10% eram classificados como Child-Pugh A. De acordo com a Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 14,63% dos participantes apresentaram ansiedade provável e 19,51% depressão provável. **Conclusões:** Foi possível traçar o perfil clínico-epidemiológico, fornecendo suporte para a compreensão desta morbidade no contexto de um hospital público de referência.

Palavras-chave: Cirrose hepática alcoólica; abuso de álcool; epidemiologia; ansiedade; depressão

AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DA VEIA SAFENA MAGNA APÓS TERMOABLAÇÃO POR LASER

Camila Beatriz Serrano de Oliveira

Esdras Marques Lins

RESUMO

Introdução: Nos últimos anos, surgiram técnicas cirúrgicas menos invasivas para o tratamento da doença venosa crônica (DVC) dos membros inferiores, entre elas, a termoablação da veia safena magna (VSM). Essa técnica é considerada, em vários centros do mundo, como a primeira opção de tratamento das varizes, por se tratar de um procedimento com redução dos eventos adversos pós-operatórios, menor tempo de hospitalização, além da diminuição da chance de recidiva clínica e melhora da qualidade de vida, quando comparada à cirurgia tradicional. Apesar de ser considerada padrão-ouro, a termoablação por laser ainda é uma técnica recente, havendo necessidade de maior entendimento acerca das alterações morfofuncionais na VSM após a sua ablação. **Objetivos:** Avaliar as alterações morfofuncionais da VSM após a sua termoablação por laser. **Métodos:** Coorte prospectiva com população composta por 23 pacientes adultos (28 veias safenas) com DVC dos membros inferiores submetidos à cirurgia de termoablação por laser da VSM no Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas/EBSERH-UFPE. Foi realizado mapeamento venoso com ultrassonografia Doppler no pré-operatório e 90 dias após termoablação por laser e a veia safena magna foi analisada quanto aos seguintes parâmetros: diâmetro, presença de refluxo e presença de oclusão. **Resultados:** A idade média dos pacientes foi de 48,96 anos e, entre as veias tratadas, 67,9% pertenciam a pacientes do sexo feminino. As classes CEAP mais prevalentes corresponderam a C3 (39,3%), C4 (35,7%) e C2 (21,4%). No acompanhamento ecográfico após 90 dias da termoablação por laser, houve redução estatisticamente significativa em todos os diâmetros da VSM submetidos a análise. Todas as 28 veias safenas encontraram-se ocluídas ao longo do seu trajeto, além de não apresentarem refluxo. **Conclusão:** A termoablação por laser da veia safena magna é uma boa opção para o tratamento da insuficiência venosa superficial, demonstrado através de altas taxas de oclusão, ausência de refluxo e redução de diâmetro em todos os segmentos que foram objeto de estudo.

Palavras-chave: veia Safena; ultrassonografia doppler; técnicas de ablação; insuficiência venosa

IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO DE PÓLIPOS DIMINUTOS RESSECADOS POR VIA ENDOSCÓPICA DE PACIENTES SUBMETIDOS À COLONOSCOPIA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA (IMIP)

Maria Laura Moura de Oliveira Felix

Julyanne Luize de Lima Rios Castro

RESUMO

Introdução: Os pólipos diminutos, aqueles menores que 5 mm, são lesões precursoras de relevância para o rastreio de câncer colorretal (CCR), haja vista que correspondem a 80% dos pólipos encontrados endoscopicamente. A maioria dos cânceres colorretais são originados da displasia epitelial acentuada somada a outras alterações como, por exemplo, diferenciação, proliferação e crescimento celular, determinando a formação dos pólipos adenomatosos que de forma progressiva evolui para carcinoma. A interrupção desta sequência é possível com o diagnóstico precoce e ressecção das lesões pré-neoplásicas realizados através da colonoscopia.

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil dos pólipos diminutos ressecados de pacientes que realizaram colonoscopias no setor de endoscopia do IMIP e analisar sua importância no rastreio do câncer colorretal.

Métodos: Realizado um estudo retrospectivo de corte transversal, em centro único. Foram considerados pacientes com 50 a 75 anos que realizaram colonoscopia completa, no período entre 2018 e 2019, no setor de endoscopia digestiva do IMIP, sendo excluídos pacientes com colonoscopia parcial, presença de lesões suspeitas para neoplasia, cirurgia colorretal prévia ou em seguimento de adenoma anterior. Os pólipos são classificados quanto a localização, tipo histológico, morfologia, tamanho e quantidade. **Resultados:** Foram selecionados 634 colonoscopias, em que 40% apresentavam pelo menos um pólipo, totalizando 360 pólipos ressecados. Quanto às suas características, são em sua maioria menores que 5mm (67%), de morfologia séssil (86%), apresentando distribuição homogênea em todos os segmentos, no entanto observa-se maior frequência de pólipos hiperplásicos no reto e de adenomas em pólipos maiores que 5mm. **Conclusão:** Os pólipos diminutos são frequentes e estão implicados na origem do câncer colorretal. Neste estudo não foi encontrada nenhuma lesão avançada em pólipos com menos de 5mm. Observamos maior frequência de pólipos adenomatosos em lesões maiores que 5mm e a prevalência dos pólipos hiperplásicos ressecados do reto. As estratégias para diagnóstico óptico ou através do uso da inteligência artificial, se utilizadas de rotina, poderiam auxiliar na avaliação histopatológica

presumida das lesões pré neoplásicas, reduzindo custos e riscos da realização de polipectomias desnecessárias

Palavras-chave: pólipo adenomatoso diminuto; câncer colorretal; colonoscopia

PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE SILENCIOSO SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO TUTORIAL NA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

Gabriela Costa Sarinho

Ana Rodrigues Falbo

RESUMO

Introdução: Na Aprendizagem Baseada em Problemas se trabalha em pequenos grupos, o que favorece a discussão e a elaboração de ideias. Nesse contexto, a contribuição verbal se torna muito importante e o silêncio do estudante pode ser considerado incompatível com a aprendizagem colaborativa. Sendo assim, estudantes silenciosos são vistos, frequentemente, como uma falha do processo de aprendizagem, uma vez que a contribuição verbal pode ser considerada como fundamental para a efetividade dessa metodologia. **Objetivo:** compreender os significados atribuídos pelos estudantes silenciosos à sua participação no grupo tutorial na perspectiva da aprendizagem colaborativa. **Métodos:** realizado estudo qualitativo na Faculdade Pernambucana de Saúde, entre setembro de 2022 a outubro de 2023, envolvendo estudantes silenciosos de medicina. Foi utilizado o grupo focal como forma de coleta das informações e o critério de saturação para definir o número de grupos a serem realizados. O roteiro de que norteou a discussão nos grupos foi elaborado com base na aprendizagem colaborativa. A análise foi feita segundo os pressupostos da aprendizagem colaborativa e utilizada a técnica da análise de conteúdo de Bardin, na modalidade temática apresentada por Minayo. **Resultados:** os estudantes concordaram que o nível de participação é multifatorial sendo influenciado por aspectos pessoais; estímulo oferecido pelo tutor; nível de preparo do estudante para a discussão; quantidade de conteúdos e tamanho dos módulos; quantidade de participantes no grupo; estrutura roteirizada da discussão e presença do estudante dominante. Trouxeram que o processo de adaptação a uma metodologia de aprendizagem ativa pode ser dificultado pela familiarização com os métodos tradicionais de ensino. Enxergam como papel do tutor, identificar e acolher os estudantes silenciosos, além de sugerir estratégias que facilitem a sua participação. **Conclusões:** a partir da análise das falas dos participantes, foram identificadas as seguintes categorias analíticas: Motivos para o comportamento silencioso e a influência da dinâmica do grupo; Reflexo do processo de adaptação à metodologia na percepção do estudante silencioso e a Intervenção do tutor na percepção do estudante silencioso. Aspectos éticos: a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade Pernambucana de Saúde sob o CAAE: 60914322.4.0000.5569 e Número do Parecer: 5.563.392.

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem colaborativa; estudantes; tutoria

A INFLUÊNCIA DA ESTÉTICA E DO CULTO AO CORPO NA AUTOESTIMA DE ESTUDANTES MULHERES DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA: UM ESTUDO QUALITATIVO

Maria Júlia Bispo Justino

Juliana de Farias Pessoa Guerra

RESUMO

Introdução: O culto ao corpo e à estética são instrumentos de adequação a valores idealizados ao padrão de beleza, sendo uma construção conforme aspectos culturais e biológicos. Após entrevistas com estudantes de medicina em Recife, percebemos o processo de subjetivação desse grupo na formação da autoestima quanto a essa influência. **Objetivos:** Compreender a percepção de estudantes de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) a respeito do impacto das representações sociais de estética e de culto ao corpo na sua autoestima. **Metodologia:** Estudo qualitativo fenomenológico e hermenêutico, com entrevistas em profundidade, em jovens entre 20 e 38 anos de Medicina da FPS. **Resultados:** A insatisfação das entrevistadas está relacionada ao peso; a maioria já realizou algum procedimento estético. A supervalorização da construção corporal tem espaço privilegiado, como verificado em falas associando o padrão de beleza à cultura “fitness”. **Considerações finais:** Os cuidados com aparência e corpo são essenciais não apenas à saúde, mas também ao bem-estar. Evidenciou-se que o problema reside na propagação de um ideal inatingível e na culpabilização das entrevistadas por não atingi-lo. A “incapacidade” de alcançar o modelo leva ao sofrimento e à falta de pertencimento, agravado pela superexposição às redes sociais. O almejado padrão tem gerado baixa autoestima, insatisfação e frustração nas jovens estudantes de medicina.

Palavras-chave: Gênero; autoestima; padrão estético; rede social; sofrimento

APENDICITE AGUDA EM PACIENTE COM SÍNDROME DA MÁ ROTAÇÃO INTESTINAL: UM RELATO DE CASO

Elen Marly Parente Rufino Cecilio

Tyrone Cesar Silva Junior

RESUMO

Introdução: O objetivo desse relato foi de destacar um caso cirúrgico incomum de apendicite com dor em fossa ilíaca esquerda, secundário a quadro raro de má-rotação intestinal, identificado durante exame de imagem diagnóstico. Descrição do caso: paciente de 33 anos, do sexo masculino, buscou atendimento em serviço de emergência relatando dor abdominal difusa há 3 dias. Ao exame, foi identificada dor à descompressão brusca de fossa ilíaca esquerda, sendo realizada tomografia de abdome que identificou apendicite aguda à esquerda, associada a um caso raro de má-rotação intestinal. Após o diagnóstico, o paciente foi encaminhado para realização de apendicectomia laparoscópica de urgência, sem maiores complicações.

Discussão: apesar da má rotação intestinal ser rara, a apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo cirúrgico, sendo potencialmente fatal se não diagnosticada e tratada prontamente. Assim, é fundamental que médicos radiologistas e emergencistas conheçam e estejam aptos a diagnosticar e tratar prontamente casos atípicos como o relatado, minimizando os riscos de complicações severas ou fatais.

Palavras-chave: Abdome agudo; apendicite; anormalidades do sistema digestório

DESENVOLVIMENTO DE PODCAST PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DO ESTUDANTE À APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

Joao Guilherme de Barros Macedo

Ana Rodrigues Falbo

RESUMO

Introdução: O processo de adaptação a metodologia ativa nem sempre é fácil. Os estudantes relatam dificuldades como a mudança no ritmo e organização do estudo; despreparo para o estudo individual; assumir uma atitude proativa e desamparo ao lidar com a postura do tutor por ser diferente do professor tradicional. A necessidade de melhorar esse processo de adaptação motivou a realização de um videocast, com o objetivo de mitigar o impacto das mudanças e sua interferência na dinâmica da aprendizagem. **Objetivo:** elaborar vídeos sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas para estudantes de saúde ingressantes. **Métodos:** estudo de elaboração de videocast educativo na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), entre setembro de 2022 a outubro de 2023. **Etapas de elaboração do videocast:** Fase I: Planejamento - identificação das necessidades do público alvo para elaboração dos conteúdos; Fase II: Pré-produção - desenvolvida a concepção do projeto, conteúdos roteirizado; Fase III: produção. **Resultados:** a gravação do videocast, foi realizada no estúdio da Educação à Distância da instituição. Presentes funcionários para manuseio de equipamentos, e auxílio para guiar os dois hosts (os estudantes entrevistados) e a convidada. Foram utilizados do estúdio seu cenário, telacisco, três câmeras de vídeo (filmadora Sony nx5r com lente Fixa, e duas mirrorless: Sony A6500 com Lente Sony 18-105 e uma Sony A6600 com Lente Sony 24-70) mixer digital zoom podtrack P8 (para gravação do áudio), três microfones shure MV7, Headphones superluxe do estúdio para monitoração do áudio. A gravação durou em média uma hora e trinta minutos, com algumas iniciais e pontuais interrupções, gerando, ao final de sua edição, um videocast de cinquenta minutos e treze segundos. Para edição, foi utilizado o programa Adobe Premiere, no qual, os profissionais de vídeo fizeram os cortes, ajustes de cores, inserção dos lower thirds (as tarjetas com os nomes dos 4 participantes), vinheta e ajustes de áudio e revisão. O material foi divulgado na rede social: <https://open.spotify.com/episode/4HoENeqJogL8iUFFZUWJ7H?si=c2edc83f471d47d2> **Conclusões:** produzido videocast com informações básicas sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas, seguindo as etapas técnicas recomendadas com a finalidade de colaborar com a adaptação do estudante ingressante.

Palavras-chave: Filme e vídeo educativo; aprendizagem baseada em problemas; estudantes

ASSOCIAÇÃO ENTRE COGNIÇÃO, SAÚDE MENTAL E ESPIRITUALIDADE EM IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP) DE PERNAMBUCO.

Rayza Cecília Chaves de Siqueira

Arturo de Pádua Walfrido Jordán

RESUMO

Introdução: Avaliar a associação entre cognição, saúde mental e espiritualidade em idosos institucionalizados do Abrigo Cristo Redentor (ACR) em Pernambuco. **Metodologia:** Estudo observacional, analítico, de corte transversal, quantitativo, realizado de Agosto de 2022 a Agosto de 2023. A coleta de dados foi feita através de prontuário e por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM); da Escala Reduzida de Depressão Geriátrica (EDG) e da Escala de Bem-Estar Espiritual (EBE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o parecer 5.689.073 e seguiu todos os preceitos éticos da Resolução 466/10 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Os dados coletados foram submetidos ao processamento estatístico, sendo utilizado o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 26. Além disso, foram realizados os testes de qui-quadrado e exato de Fisher. Nos casos em que o p-valor foi menor que 0,05, considerou-se que a relação entre as variáveis foi significativa. **Resultados:** A amostra final contou com 20 idosos após a aplicação do MEEM, identificando aqueles com a cognição mais preservada. Desses, 6 apresentaram depressão leve e 2 depressão severa, e todos os 20 idosos possuem nível moderado de bemestar espiritual, constatando-se uma possível associação entre um bem-estar espiritual, menores índices de depressão e menor declínio cognitivo na amostra. **Conclusão:** Os idosos institucionalizados estão inseridos em um contexto de vulnerabilidade social, o qual impacta no comprometimento cognitivo e nos níveis de depressão, cenário em que a espiritualidade pode ser uma aliada.

Palavras-chave: depressão; disfunção cognitiva; espiritualidade; Instituição de longa permanência para idosos; saúde do idoso

DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS GESTACIONAIS NO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO DE UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA QUATERNÁRIA: UM CASO-CONTROLE

Ana Cecília Araújo Cabral

Kledoaldo Oliveira de Lima

RESUMO

Introdução: Compreender os fatores associados aos distúrbios hipertensivos gestacionais e identificar o perfil epidemiológico da amostra estudada. **Métodos:** trata-se de um estudo caso-controle, o qual incluiu prontuários de 600 mulheres atendidas no pré-natal do ambulatório de alto risco do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP), no período de setembro a dezembro de 2022. **Resultados:** a média da idade das pacientes foi de 29,5 anos, sendo 55,3% autodeclaradas pardas; 28,7% secundigestas; 38,8% do tipo sanguíneo “O positivo”; 54,2% desempregadas; 54,7% apresentaram gestação de risco prévia e 53,6% foram acometidas por distúrbios hipertensivos na última gestação, principalmente, hipertensão crônica (18,3%) e pré-eclâmpsia sobreposta (12,8%). A ocorrência de distúrbios hipertensivos gestacionais foi correlacionada com alta relevância estatística ($p < 0.05$) à idade materna avançada; idade da primeira gestação; antecedente familiar de hipertensão; gestação de risco prévia; antecedente pessoal de hipertensão crônica e diabetes mellitus; obesidade e presença concomitante de diabetes gestacional. **Conclusão:** distúrbios hipertensivos gestacionais são complicadores prevalentes de gestações, logo, deve-se detectar precocemente os fatores de risco e conscientizar a gestante acerca dos hábitos de vida. Ademais, é necessário mais estudos atualizados em diferentes locais do país e envolvendo multicentros, a fim de obter um melhor esclarecimento acerca dos fatores preditores dos distúrbios hipertensivos gestacionais.

Palavras-chave: Gestação de alto risco; hipertensão gestacional; hipertensão arterial sistêmica.

AVALIAÇÃO DE INFECÇÃO POR CMV E EBV NA DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO – UM ESTUDO DESCRITIVO RETROSPECTIVO

Daniel Oliveira Araújo

Ligia Patrícia de Carvalho Batista Éboli

RESUMO

Introdução: Doença linfoproliferativa pós-transplante (DLPT) é uma condição clínica de alta mortalidade que pode estar relacionada a proliferação do vírus Epstein-Barr (EBV) e do Citomegalovírus (CMV) em pacientes submetidos à imunossupressão crônica. A monitoração da replicação viral através da técnica de PCR pode ser uma ferramenta útil para evitar o desenvolvimento de DLPT, uma vez que permite redução ou retirada da imunossupressão precocemente. **Objetivo:** Avaliar sorologia para CMV e EBV antes do transplante hepático do receptor e doador e sua relação com doença linfoproliferativa pós-transplante hepático. **Métodos:** Será realizado um estudo corte transversal, de caráter descritivo exploratório com abordagem quantitativa através de uma análise retrospectiva de prontuários de pacientes pediátricos com idade de zero a 18 anos submetidos a transplante hepático a partir do ano 2000 e em acompanhamento no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, no período de setembro de 2022 a agosto de 2023. Os pacientes que não possuem dados clínicos e laboratoriais necessários para pesquisa nos prontuários serão excluídos da pesquisa. **Aspectos éticos:** O presente estudo atenderá às recomendações para pesquisa em seres humanos, priorizando a dignidade, a autonomia, a não maleficência, beneficência e a proteção aos sujeitos de pesquisa, e atenderá à resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e terá início após a aprovação. Não há conflitos de interesses nessa pesquisa.

Palavras-chave: Citomegalovírus; imunossupressão; transplante de fígado; transtornos linfoproliferativos; pediatria

SÍNDROME DE KAWASAKI ATÍPICA EM MENOR DE 4 MESES: UM RELATO DE CASO.

Eduardo de Andrade Lima Brendel Braga

Juliana Amorim Carvalho

RESUMO

Introdução: Doença de Kawasaki é uma vasculite sistêmica da infância, de etiologia desconhecida, sendo a principal causa de cardiopatia adquirida em crianças nos países desenvolvidos. Aproximadamente 85% dos casos, ocorrem em crianças menores de 5 anos, com predomínio no sexo masculino e de origem asiática. Apresenta incidência anual estimada de 3/100.000 crianças abaixo de 5 anos. **Objetivos:** O objetivo principal deste estudo foi descrever um caso de Doença de Kawasaki Atípica que acometeu um menor com 2 meses e 21 dias de vida, que apresentou, inicialmente, persistência de dilatação das artérias coronárias após tratamento com antiagregante e imunoglobulina endovenosa, mas evoluiu com regressão da lesão arterial. **Método:** Estudo tipo relato de caso realizado através de consulta de prontuário, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. **Relato de Caso:** Lactente, 2 meses e 21 dias de vida, com febre de 14 dias de duração e rash cutâneo, diarreia, irritabilidade, sendo internada no IMIP para investigação com exames laboratoriais e de imagem. Realizado ecocardiograma transtorácico com evidência de dilatação de coronárias. Iniciado tratamento com imunoglobulina intravenosa e anti-agregante plaquetário oral. Paciente evoluiu com remissão total dos sintomas, melhora laboratorial e estabilidade clínica. Optado por reduzir dose de anti-agregante plaquetário e alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial com equipe de pediatria e cardiologia. Quatro meses após alta, realizou novo ecocardiograma de controle, que evidenciou piora da dilatação coronariana, sendo optado por novo internamento para controle e estabilização. Após reajuste de dose do antiagregante plaquetário, houve progressiva melhora da dilatação coronariana, e a paciente recebeu alta para acompanhamento ambulatorial. Durante reavaliação com equipe pediatria e cardiologia, menor permaneceu assintomática, e o antiagregante plaquetário foi suspenso. Em consulta de reavaliação, 3 anos após o diagnóstico, menor se manteve clinicamente bem, mantendo-se a conduta expectante. **Conclusão:** Importância do conhecimento dos critérios clínicos para o diagnóstico da Doença de Kawasaki, mesmo na vigência de quadro atípico, sendo um diagnóstico diferencial importante em crianças com febre inexplicada por mais de cinco dias.

Palavras-chave: Doença de Kawasaki, Vasculite Sistêmica, Doença das Coronárias, Antiagregante Plaquetário
Palavras-chave: Doença de Kawasaki; vasculite sistêmica; doença das coronárias; antiagregante plaquetário

INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UNIDADE DE CIRURGIA DE HOSPITAL PÚBLICO DO RECIFE

Ádonis Pereira de Melo

Osnir de Sá Viana

RESUMO

Introdução: A espiritualidade sempre esteve presente em todas as civilizações e, diante da sua importância na vida humana e na qualidade de vida (QV), a Organização Mundial de Saúde (OMS) incorporou a dimensão espiritual ao conceito de saúde. Atualmente, há grande preocupação na QV no âmbito pessoal e profissional, sobretudo, entre os trabalhadores da saúde. O ambiente hospitalar possui muitos elementos que geram fadiga física e mental nos profissionais, dentre eles, os trabalhadores do bloco cirúrgico são os mais vulneráveis à pior QV. **Objetivo:** Avaliar a influência da espiritualidade na qualidade de vida dos profissionais de saúde em unidade de cirurgia de hospital público em Recife. **Método:** Trata-se de um estudo transversal envolvendo profissionais de saúde que atuam no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), realizado aplicando-se questionário online com perguntas de aspectos sociodemográficos e sobre o Instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde - Módulo Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais (WHOQOL-SRPB). O link foi encaminhado por via WhatsApp com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, entre setembro de 2022 a março de 2023 e os dados foram exportados ao Microsoft Excel®. A pesquisa apenas foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, conforme parecer nº 5.173.279 (FPS) e o parecer nº 5.436.150 (HC-UFPE). **Resultados:** Houve predomínio de profissionais de saúde do sexo feminino, idade média de 43 anos, casados, da religião católica e que trabalham como técnicos de enfermagem. As facetas Admiração e Força espiritual do WHOQOL-SRPB obtiveram maiores pontuações, enquanto a faceta Paz interior obteve a menor pontuação. **Conclusão:** Constatou-se que os profissionais de saúde apresentaram nível elevado de QV na maioria dos domínios estudados. Visto que a espiritualidade tem relação com uma melhor QV, é importante que a equipe gestora hospitalar e os próprios profissionais de saúde compreendam a importância da valorização da espiritualidade como ferramenta aliada na preservação e melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chave: Espiritualidade; qualidade de vida; profissionais de saúde; centro cirúrgico

EFEITO PROTETOR ENTRE O SEXO MASCULINO E FEMININO DAS VACINAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19: UMA COORTE RETROSPECTIVA OBSERVACIONAL

Giovanna Maria Silva Cicolo

Guilherme Jorge Costa

RESUMO

Introdução: A identificação de grupos de pacientes com melhor resposta vacinal pode ser de elevada relevância para a tomada de decisão de políticas de saúde pública para controle da COVID-19. **Objetivo:** avaliar a frequência de admissão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI), taxa de mortalidade e sobrevida de 28 dias entre pacientes do sexo masculino versus feminino em pacientes não vacinados e vacinados antes da hospitalização por COVID-19. **Métodos:** Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo realizado com dados de paciente internados em um hospital de referência, entre julho de 2020 e junho de 2022 na cidade do Recife, Brasil. **Resultados:** Assim, 1.921 pacientes foram analisados neste estudo. Sendo 886 (46,1%) do sexo feminino. As mulheres eram mais idosas (63,8 + 16 versus 60,8 + 15,7; $p < 0,001$), viviam sem companheiro (87.5% vs 74.1%; $p < 0,001$) quando comparados aos homens. Houve efeito protetor das vacinas em ambos os grupos, embora não evidenciaram diferenças significativas em termos de gravidade, mortalidade e/ou sobrevida entre os grupos do sexo masculino e feminino, mesmo entre pacientes internados vacinados ou não-vacinados. Doses acumulativas das vacinas foram efetivas em reduzir frequência de admissão na UTI, uso de VMI e mortalidade intra-hospitalar. **Conclusão:** as vacinas contra a COVID-19 foram efetivas em reduzir mortalidade, necessidade de admissão em UTI e uso de VMI em pacientes hospitalizados por COVID-19, inclusive apresentando efeito acumulativo protetor à medida que novas doses foram aplicadas, independentemente do gênero dos pacientes.

Palavras-chave: COVID-19; vacinação; gênero; ventilação mecânica; mortalidade intra-hospitalar; sobrevida

USO DO OSCE NA AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DESEMPENHO EM PRIMEIROS SOCORROS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Vinicyus Eduardo Melo Amorim

Edvaldo da Silva Souza

RESUMO

Introdução: Avaliar o conhecimento e desempenho de estudantes através do uso do Objective structured clinical examination (OSCE) para agir em situações de parada cardiorrespiratória (PCR) e obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE). **Método:** Trata-se de um estudo intervencionista de análise antes e depois em estudantes do ensino médio. Os estudantes foram submetidos a um questionário teórico (QT) e dois OSCEs sobre PCR e OVACE. Em seguida, os estudantes receberam um treinamento de primeiros socorros com conteúdo teórico-prático, sendo, posteriormente, submetidos ao mesmo QT e aos dois OSCEs. Para análise das variáveis foram aplicadas o teste ANOVA, Wilcoxon, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, bem como o teste de correlação de Pearson. **Resultados:** 164 estudantes foram incluídos na análise final. A mediana de acertos do primeiro QT foi 4.00 de 10.00 pontos, enquanto a do segundo 8.00. A mediana da pontuação do primeiro e segundo OSCE de RCP foi 0.00 e 4.5 (máximo de 8.00), respectivamente. A pontuação do primeiro e segundo OSCE de OVACE foi 1.00 e 2.00 (máximo de 3.00), respectivamente. Não houve associação das pontuações com idade e turma ($p>0,05$). **Conclusão:** O uso do OSCE antes e após o treinamento demonstrou um aumento na mediana de acertos superior na segunda etapa, sugerindo sua boa aplicabilidade no treinamento dos estudantes.

Palavras-chave: Primeiros socorros; reanimação cardiopulmonar; engasgo; educação baseada em competências ensino médio

IMPACTO DO CLEARANCE DE CREATININA PRÉ-OPERATÓRIO COMO FATOR DE RISCO PARA INJÚRIA RENAL AGUDA NO PÓS-OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: COORTE RETROSPECTIVA EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NORTE-NORDESTE

Rodrigo Savio Oliveira Melo

RESUMO

Introdução: Avaliar o clearance de creatinina (ClCr) pré-operatório como preditor de risco para a incidência de injúria renal aguda (IRA) no pós-operatório da cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM). **Métodos:** Trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectivo, com dados obtidos em banco de dados secundário do Setor de Cirurgia Cardiovascular do Adulto do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Foram incluídos pacientes adultos submetidos a CRM isolada entre agosto de 2021 e maio de 2023. O ClCr foi calculado pelas fórmulas de Cockcroft-Gault e pelo CKD-EPI 2021. A análise estatística foi realizada com teste t de Student para as variáveis quantitativas e o Qui-quadrado para as categóricas. O valor de $p < 0,05$ foi utilizado como critério de significância estatística. Resultados: Foram incluídos 184 pacientes. A média de idade foi de 62 anos. Houve injúria renal aguda até o terceiro dia pós-operatório em 19% dos pacientes. Destes, 17% apresentaram quadro de falência renal e 2,2% necessitaram de hemodiálise. A mortalidade em 30 dias foi 3,8%. Não houve associação entre a incidência de IRA e a mortalidade em 30 dias. A média da creatinina sérica (Cr) pré-operatória foi $1,05 \pm 0,32$. A média da taxa de filtração glomerular (TFG) pelo CKD-EPI foi $78,37 \pm 21,3$. Na análise entre os grupos com IRA e sem IRA, não houve diferença significativa entre os níveis de Cr e de TFG pela fórmula de Cockcroft & Gault. Houve diferença significativa entre a TFG pré-operatória calculada pelo CKD-EPI no grupo que desenvolveu IRA: $71,8 \text{ ml/min/1,73m}^2$ versus $79,9 \text{ ml/min/1,73m}^2$ no grupo sem IRA ($p=0,044$). Conclusões: O ClCr calculado pelo CKD-EPI destacou-se como preditor de injúria renal aguda em pacientes submetidos a CRM.

Palavras-chave: clearance de creatinina; injúria renal aguda; pré operatório

O PERFIL DOS DOADORES DE FÍGADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2018 A 2021

Laura de Santana Costa

Rebecca Dantas Thorp

RESUMO

Introdução: Caracterizar o perfil epidemiológico, clínico e sociodemográfico dos doadores de fígado no período de 2018 a 2021 no estado de Pernambuco. **Métodos:** Estudo descritivo do tipo corte transversal, realizado por meio da coleta de dados de doadores hepáticos efetivos com idade igual ou superior a 14 anos, disponíveis no Sistema Nacional de Transplantes e em prontuários do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, no período de janeiro de 2018 até dezembro de 2021. **Resultados:** Foram coletados dados de 349 doadores, a maioria do sexo masculino, com faixa etária predominante 41 a 50 anos, de cor parda. Houve maior incidência de procedentes da Região Metropolitana do Recife. Ocorreu prevalência de doadores não tabagistas, não etilistas e não usuários de drogas. A principal causa de óbito foi traumatismo cranioencefálico, seguida de acidente vascular encefálico hemorrágico, com maioria dos óbitos no Recife. **Conclusão:** A análise do perfil dos doadores de fígado de Pernambuco mostrou uma maior necessidade de identificar precocemente um potencial doador. Há necessidade de reforçar a disseminação de informações para incentivar a doação de órgãos, reduzindo a taxa de recusa familiar e a lista de espera, a partir da maior quantidade de doadores efetivos.

Palavras-chave: Obtenção de tecidos e órgãos; doadores de tecidos; transplante de fígado; Sistema Único de Saúde

PADRÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR SARS COV-2: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Lara Pinheiro Ferreira Tenório

João Guilherme Bezerra Alves

RESUMO

Introdução: Verificar o padrão de atividade física nos pacientes que tiveram COVID-19 e a associação com o desenvolvimento de pneumonia grave. **Métodos:** estudo transversal, aninhado em um estudo multicêntrico caso-controle: “Influência do padrão de atividade física e nível sérico de vitamina D nos desfechos da COVID-19. Em um formulário foram registrados dados de 118 adultos: características socioeconômicas, demográficas, aspectos clínicos da COVID 19 e seus desfechos assim como o questionário internacional de atividade física, o qual avaliava, em equivalente metabólico, o gasto durante uma semana em atividades de trabalho, transporte, entre outras. A análise estatística realizou a distribuição de frequências e para comparar as variáveis categóricas foi utilizado o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher, valor de $p < 0,05$. **Resultados:** Dos 118 indivíduos, a análise com o questionário IPAQ concluiu que 86 (72,9%) dos entrevistados não realizavam atividade física ou realizavam exercícios classificados como leve. Identificou-se pneumonia grave em 71 (60,2%) dos indivíduos. Houve associação significativa entre atividade física e pneumonia grave, $p < 0,0001$. **Conclusão:** Estudos anteriores mostraram que o padrão de atividade física está associado à gravidade da doença e à mortalidade em pacientes com COVID-19. Este estudo acrescenta que um padrão prévio de atividade física moderada ou vigorosa oferece proteção com casos graves da COVID-19.

Palavras-chave: SARS-Cov-2; síndrome respiratória aguda grave; atividade física

NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D EM CASOS DA COVID-19: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Giovana do Rego Barros Malheiros

João Guilherme Bezerra Alves

RESUMO

Introdução: analisar os níveis séricos de vitamina D em pacientes que contraíram SARS-Cov-2 e desenvolveram síndrome respiratória aguda grave (SRAG). **Métodos:** estudo transversal, aninhado em um estudo multicêntrico caso-controle: “Influência do padrão de atividade física e nível sérico de vitamina D nos desfechos da COVID-19. Em um formulário foram registrados dados de 118 adultos: características socioeconômicas, demográficas, aspectos clínicos da COVID 19 e os níveis séricos de 25-hidroxi-vitamina D. A análise estatística realizou a distribuição de frequências e para comparar as variáveis categóricas foi utilizado o teste do quiquadrado ou teste exato de Fisher, valor de $p < 0,05$. Resultados: Dos 118 indivíduos, 27 (22,9%) tinham acima de 60 anos. Além disso, 73 (61,9%) apresentavam níveis séricos de vitamina D considerados deficientes ou insuficientes e 75 (72,1%) não faziam reposição. Ao avaliar a associação entre níveis séricos deficientes ou insuficientes de Vitamina D e o desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave, necessidade de UTI durante a hospitalização e ventilação mecânica, não houve estatística significativa, $p=0,721$, $p=0,361$ e $p=0,881$, respectivamente. Conclusão: No presente estudo não se encontrou relação entre os valores deficientes ou insuficientes de vitamina D e a gravidade da COVID 19.

Palavras-chave: COVID-19; vitamina D; SRAG

AVALIAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E ODONTOLOGIA

Arthur Lira de Melo

Paula Ferdinanda Conceição de Mascena Diniz Maia

RESUMO

Introdução: Avaliar o uso de medicamentos psicotrópicos entre os estudantes de Medicina e Odontologia de uma faculdade da cidade de Recife. **Métodos:** Estudo observacional, analítico e transversal, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde. Os critérios de inclusão foram estudantes, devidamente matriculados, dos cursos de medicina do 1º ao 6º ano e de odontologia do 1º ao 3º ano da Faculdade Pernambucana de Saúde. A coleta de dados ocorreu por meio de um formulário e os resultados foram armazenados em um banco de dados. **Resultados:** Participaram um total de 346 estudantes, de 18 a 50 anos, sendo 87,86% do curso de Medicina e 12,14% de Odontologia. O sexo predominante foi o feminino, correspondendo a 65,79% de medicina e 95,24% de odontologia. Do total de graduandos, a maioria residia na Região Metropolitana do Recife (RMR), com 95,72% de Medicina e 88,10% de Odontologia, e morava com pais ou companheiros, sendo 66,12% de medicina e 85,71% de odontologia. Quanto à qualidade do sono, 40,46% e 52,38% dos acadêmicos de medicina e odontologia, nessa ordem, indicaram não ter sono restaurador. Quanto à cobrança exigida pelo curso, 86,51% dos estudantes de Medicina e 71,43% dos de Odontologia, responderam que se sentiam muito cobrados. Próximo a 50% dos estudantes de Medicina (48,68%) e de Odontologia (47,62%) relataram utilizar psicofármacos pelo menos uma vez na vida. Observou-se, ainda, que o uso de psicotrópicos foi, principalmente, apontado pelos participantes que responderam não possuir religião (59,04%). O relacionamento com a família (37,74% de Medicina e 48,39% de Odontologia) e companheiros ou companheiras (27,43% e 43,33%, seguindo a mesma ordem) foram indicados como os principais desencadeantes para o uso desses fármacos. Dentre as classes de medicamentos, a mais utilizada foi o antidepressivo (30,92%) pelos estudantes de Medicina e ansiolíticos (28,57%) pelos estudantes de Odontologia. **Conclusões:** Acadêmicos de medicina e odontologia são populações suscetíveis ao uso de medicamentos psicotrópicos. Fatores epidemiológicos, socioeconômicos e acadêmicos foram determinantes como agentes potencializadores ao uso desses fármacos. A ausência de práticas religiosas apresentou relação significativa com o uso de fármacos psicotrópicos. O principal diagnóstico encontrado entre os estudantes foi Transtorno de Ansiedade Generalizada e a classe medicamentosa mais

consumida foi de antidepressivos, pelos acadêmicos de medicina, e ansiolíticos, pelos de odontologia.

Palavras-chave: Psicotrópicos; estudantes de medicina; estudantes de odontologia; automedicação; ansiedade

PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL ASSOCIADO À DISFUNÇÃO IMUNE DE PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL MUITO PRECOCE

Dara Mariel Gomes de Almeida

Michela Cynthia da Rocha Marmo

RESUMO

Introdução: Avaliar o perfil clínico-laboratorial associado à disfunção imune dos pacientes com Doença Inflamatória Intestinal (DII) de início antes dos seis anos de idade. **Métodos:** Realizado um estudo de corte transversal de amostra casuística. A pesquisa foi realizada no Serviço de Gastroenterologia Pediátrica e no Hospital-Dia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife, Pernambuco. A coleta de dados ocorreu entre agosto de 2022 até agosto de 2023. Os dados foram coletados retrospectivamente e digitados em banco específico do Excel. **Resultados:** A amostra incluiu 42 pacientes com DII de início muito precoce acompanhados no IMIP. Apresentaram idade média de diagnóstico de 46 meses e prevalência do sexo masculino. Quanto às características clínicas, a diarreia foi o sintoma mais frequente, presente em 92,86% dos pacientes, seguido da enterorragia e da dor abdominal. No que se refere à avaliação laboratorial, apenas 1 paciente apresentou IgG abaixo do percentil 3. Em relação ao perfil linfocitário, 34,62% dos linfócitos CD4, 8,33% dos CD8 e 65,22% dos CD19 apresentaram-se abaixo do percentil 10. **Conclusões:** Os pacientes com DII de início muito precoce consistem em um grupo de pacientes com um curso mais agressivo e associação com imunodeficiências primárias, é importante o seguimento e atenção rigorosa para estas possibilidades com acompanhamento clínico e laboratorial regular.

Palavras-chave: Doenças inflamatórias intestinais; doenças da imunodeficiência primária crianças; avaliação de sintomas; testes laboratoriais

SINTOMAS DE RINITE ALÉRGICA EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM HOSPITAL REFERÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Deborah Albuquerque de Melo

Fabiana Moura da Motta Silveira

RESUMO

Introdução: Avaliar a exacerbação de sintomas de rinite alérgica em crianças durante a pandemia de COVID-19. **Métodos:** Foi realizado um estudo do tipo corte transversal com componente analítico com crianças portadoras de rinite alérgica entre três e 12 anos de idade, atendidas no Ambulatório de Pediatria do IMIP. A coleta de dados foi realizada entre setembro de 2021 a fevereiro de 2022. Foi utilizado um formulário padrão elaborado para esta pesquisa, adaptado do International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) para entrevista dos participantes. **Resultados:** O estudo envolveu 72 crianças, sendo 51,4% do sexo masculino. A maioria residia na região Metropolitana (68,1%). Os sintomas mais frequentes incluíram espirros (93,1%), obstrução nasal (88,9%), coriza (84,7%) e prurido nasal (84,7%). A poeira foi identificada como o principal fator desencadeante (98,6%). A rinite foi classificada como persistente em 58,3% e intermitente em 41,7%, com a maioria relatando impactos no sono, escola e atividades diárias. Durante o isolamento social em 2020, espirros (90,3%), obstrução nasal (77,8%), coriza (76,4%) e prurido nasal (75%) também foram os sintomas mais comuns. **Conclusões:** A rinite alérgica é uma doença prevalente nas crianças. O controle ambiental é importante no controle da sintomatologia da doença. Na pandemia de COVID-19, os sintomas tiveram menor frequência entre a população estudada.

Palavras-chave: Rinite alérgica; crianças; exacerbação dos sintomas; COVID-19

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E SÍNDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE POR SARS-COV-2: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Carolina Medina Duarte

João Guilherme Bezerra Alves

RESUMO

Introdução: avaliar o índice de massa corpórea em casos da Covid- 19. **Método:** estudo transversal aninhado em um caso controle multicêntrico: Influência do Padrão de Atividade Física e Nível Sérico de Vitamina D nos Desfechos da Covid-19. A amostra foi composta por participantes do projeto âncora (os dados originais foram coletados no ambulatório do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira em pacientes convalescentes da COVID-19, que apresentaram ou não Síndrome Respiratória Aguda Grave). Resultados: dos 95 pacientes, 21 (22,1%) tinham acima de 60 anos de idade, 60 (63,2%) exerciam atividade remunerada, 49 (51,6%) eram casados e 48 (50,5%) possuíam ensino médio completo. Com relação a hábitos de vida, 89 (93,7%) não fumavam, 56 (58,9%) não consumiam bebidas alcólicas e 26 (27,4%) seguiam dieta alimentar. Sobre antecedentes patológicos, 70 (73,7%) indivíduos, negaram internamento anterior, 21 (22,1%) eram hipertensos e 17 (17,9%) diabéticos. De acordo com o IMC, 67 (70,5%) participantes eram obesos. Sobre evolução da doença, 62 (65,3%) desenvolveram SRAG e foram hospitalizados, 42 (44,2%) necessitaram de UTI e 10 (10,5%) foram entubados. Ao avaliar a relação entre IMC com hospitalização e desenvolvimento de SRAG, observou-se associação estatisticamente significativa $p < 0,001$. **Conclusão:** o indivíduo cujo IMC corresponde a sobrepeso e obesidade apresenta uma maior probabilidade de desenvolver formas graves por SARS-CoV-2.

Palavras-chave: SARS-Cov-2; síndrome respiratória aguda grave; índice de massa corporal

MUDANÇAS NO PERFIL DE PACIENTES INTERNADOS EM UTI PEDIÁTRICA DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN

Marcela Mendonça Tavares de Melo Nóbrega

Patrícia Gomes de Matos Bezerra

RESUMO

Introdução: Em março de 2020, foi decretada pela Organização Mundial de Saúde a pandemia de COVID-19. Como medidas iniciais para controle de pandemia foram instituídos uso de máscaras, higiene rigorosa das mãos, distanciamento social e lockdown. Apesar de toda a repercussão do ponto de vista econômico e psicossocial, o regime de lockdown teve consequências benéficas, devido a redução de procura de crianças aos serviços de emergência pediátrica. A redução da circulação de vírus respiratórios trouxe repercussões no perfil de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). **O objetivo** deste estudo é avaliar o perfil de pacientes internados na UTIP do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) durante o período da pandemia de COVID-19, comparando o grupo de pacientes internados durante lockdown e após retorno das aulas presenciais. **Método:** Esse estudo é parte de um projeto guarda-chuva do Mestrado Profissional em cuidados intensivos do IMIP. Estudo tipo corte transversal retrospectivo, comparando pacientes internados em UTIP durante dois períodos distintos. **Resultado:** 680 pacientes foram incluídos na pesquisa, dos quais 355 (41,2%) estiveram internadas no período de lockdown (de 1 de março de 2020 a 31 de julho de 2021) e 325 (37,8%) após o retorno das escolas (de 01 de agosto de 2021 a 28 de fevereiro de 2022). A principal causa de admissão na UTI nos dois grupos foi insuficiência respiratória ou desconforto respiratório grave, representando 34,9% dos pacientes no período de lockdown e 51,7% do total após retorno das escolas, com diferença estatística significativa entre eles ($p = 0,000$). **Discussão:** Houve uma redução importante do número de internamentos no período de lockdown, uma redução do número de pacientes com quadros de insuficiência respiratória e um menor número de pacientes com asma ou sibilância recorrentes internados. Isso representa uma redução dos quadros de infecção respiratória no período de lockdown. Por outro lado, houve um aumento de pacientes com prematuridade, o que pode ser secundário à dificuldade de acesso aos serviços de saúde nesse período e consequentemente redução nos acompanhamentos de pré-natal. **Conclusão:** Apesar do impacto do ponto de vista econômico e psicossocial do lockdown, essa medida trouxe uma redução do número de internamentos por quadros respiratórios na população pediátrica, levando a uma mudança no perfil de internamentos na UTIP do IMIP.

Palavras-chave: Pediatria; COVID-19; Unidade de Terapia Intensiva

COINFECCÕES BACTÉRIANAS EM PACIENTES COM COVID-19 GRAVE INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE HOSPITAL TERCIÁRIO DO BRASIL

Júlia Pereira Câmara

Kledoaldo Oliveira de Lima

RESUMO

Introdução: Determinar a taxa de coinfeção bacteriana em pacientes com coinfeção bacteriana e COVID-19 grave, prevalência bacteriana, seus perfis de resistência antimicrobiana e fatores de aumento de mortalidadenos pacientes em UTI de hospital terciário na região Nordeste do Brasil. **Métodos:** Coorte retrospectivo através de instrumento de coleta de dados, a partir dos prontuários e resultados laboratoriais de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do HC/UFPE por COVID-19 grave. Na análise descritiva as variáveis foram apresentadas em tabelas e gráficos em valores de frequências absolutas e relativas ou medidas de tendência central e dispersão. **Resultados:** 101 pacientes avaliados com taxa de coinfeção bacteriana (45,54%), (n=46), dentre esses, 50% de óbito. As bactérias mais associadas à coinfeção incluíram *Staphylococcus coagulase negativo* (37,3%), *Pseudomonas aeruginosa* (17,3%), *Acinetobacter baumannii* (16%), *Klebsiella pneumoniae* (9,3%), e *Staphylococcus aureus* (9,3%). Os perfis de resistência antimicrobiana revelaram resistência moderada a alta. Análises laboratoriais sem diferenças significativas entre os pacientes, exceto para fibrinogênio, elevado nos casos com coinfeção, não houve aumento da mortalidade. **Conclusão:** Observamos elevada taxa de coinfeção, além de resistência antimicrobianaconsiderávelnos isolados avaliados. Apesar de não haver alterações laboratoriais relevantes ou aumento de taxa de mortalidade, ressaltamos a importância da vigilância das coinfeções para uma gestão eficaz dos pacientes e de recursos hospitalares.

Palavras-chave: COVID-19; SARS-CoV-2; infecção hospitalar; resistência microbiana a medicamentos

USO DE ANTI-HIPERTENSIVOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO NARRATIVA

Felipe Japhet Valença Albuquerque

Flávio Xavier da Silva

RESUMO

Introdução: O leite materno é a melhor fonte de nutrição do lactente, sendo de extrema importância para o seu crescimento e desenvolvimento. Durante a amamentação, algumas mães podem necessitar do uso de anti-hipertensivos, devendo ser prescrito com segurança. A excreção do anti-hipertensivo no leite materno depende, principalmente, da sua concentração plasmática materna. **Objetivos:** Avaliar a excreção dos anti-hipertensivos no leite materno e o grau de segurança de cada classe de anti-hipertensivo durante a amamentação. **Métodos:** Foi realizada uma revisão narrativa com abordagem específica das classes dos anti-hipertensivos.

Resultados: A literatura analisada aponta que os inibidores da enzima conversora de angiotensina são os que apresentam menor relação leite/plasma, sendo seguros e amplamente indicados durante a amamentação, assim como os bloqueadores de canais de cálcio e os vasodilatadores, enquanto que os betabloqueadores são os de maior relação leite/plasma, aumentando a possibilidade de repercussão nos lactentes. Os bloqueadores de receptores de angiotensina II foram pouco estudados, mas os fármacos dessa classe apresentaram baixa concentração no leite materno, bem como os diuréticos que apresentaram medicamentos seguros para uso durante a amamentação. A Clonidina, da classe dos agonistas alfa-2 adrenérgicos, apresentou alta concentração no leite materno com relatos de repercussão nos lactentes. **Conclusões:** A maioria dos anti-hipertensivos estudados são considerados seguros para uso durante a amamentação, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, diuréticos, vasodilatadores e os bloqueadores de canais de cálcio, porém há ressalvas quanto ao uso de alguns medicamentos das classes dos betabloqueadores e dos agonistas alfa-2 adrenérgicos. Foram encontrados poucos estudos abordando de forma específica os bloqueadores de receptores de angiotensina II.

Palavras-chave: Aleitamento materno; leite humano; lactação; anti-hipertensivos

PROCESSO DE MORTE E O MORRER: PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E DE PSICOLOGIA EM UMA FACULDADE NO NORDESTE DO BRASIL

Claudia Bem Leite Nelson

Maria Júlia Gonçalves de Mello

RESUMO

Introdução: Na formação dos estudantes de saúde há uma escassez de debates sobre a morte e o morrer, provocando despreparo e sofrimento emocional no enfrentamento dessas situações.

Objetivo: Avaliar o nível de medo que os estudantes de Medicina e de Psicologia apresentam diante do processo de enfrentamento da morte. **Métodos:** Estudo tipo survey utilizando a Escala do Medo da Morte de Collet-Lester. Foram incluídos 333 estudantes em diferentes períodos da graduação de medicina e de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde com comparação entre os grupos através de testes estatísticos adequados. **Resultados:** Evidenciou-se um maior medo da morte do outro para ambos os cursos. Na medicina, o medo da própria morte foi maior no final do curso ($p=0,045$) e, na psicologia, houve uma redução significativa do medo da morte do outro no meio do curso ($p=0,039$). **Conclusão:** Ter uma grade curricular que trabalhe questões clínicas e psicossociais sobre a finitude da vida, pode auxiliar na redução das inseguranças e medos dos estudantes visando fornecer um cuidado integral de qualidade ao paciente.

Palavras-chave: medo; morte atitude frente à morte; educação médica; curso de psicologia

EFEITOS PSIQUIÁTRICOS EM INDIVÍDUOS PÓS-INTERNAMENTO POR COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Rodrigo Barros Mendonça Villarroel, David Pinheiro

RESUMO

Introdução: Como constatado em outras pandemias e desastres humanos, os índices de transtornos mentais sofrem mudanças. Na pandemia do COVID-19, espera-se uma maior prevalência e maior durabilidade dos sintomas neuropsiquiátricos, principalmente, em pacientes internados em leitos de UTI, os quais passaram por situações de maior estresse.

Objetivo: Revisar e descrever os efeitos neuropsiquiátricos do internamento hospitalar por COVID-19, bem como suas consequências na prescrição de medicações psicotrópicas.

Métodos: Realizou-se revisão interativa da literatura nas bases de dados, embasado nas diretrizes do PRISMA. Foram empregados descritores e/ou palavras chave, de acordo com a base de dados, suas derivações e traduções em inglês e espanhol, assim como combinações utilizando operadores booleanos. **Resultados:** Os efeitos psiquiátricos decorrentes de infecções graves por COVID-19, reportou uma prevalência significativa de sintomas psiquiátricos em pacientes após a alta hospitalar em um período de até 1 ano. A presença de comorbidades psiquiátricas durante a infecção pela COVID-19 está associada a um aumento nas taxas de hospitalização e mortalidade. O uso de psicotrópicos e iniciados antes da infecção pelo COVID-19 está associado a desfechos mais graves, possivelmente devido ao aumento do risco de eventos cardiovasculares e tromboembólicos, bem como à interferência na resposta imunológica adequada do organismo. O delirium emergiu como o efeito psiquiátrico mais prevalente nos diversos estudos analisados. **Conclusão:** Encontrou-se associação entre a hospitalização por COVID-19 e os sintomas psiquiátricos, que também estão correlacionados com uma maior mortalidade decorrente do internamento. Novos estudos são imperativos para elucidar as múltiplas associações estabelecidas entre sintomas psiquiátricos e COVID-19.

Palavras-chave: SARS-CoV-2; psicotrópicos; hospitalização; transtornos mentais

AVALIAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS NEBULIZADORES UTILIZADOS POR PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA ATENDIDOS NO IMIP: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Maria Eduarda Rendall Rodrigues de Moura

Patrícia Gomes de Matos Bezerra

RESUMO

Objetivo: Avaliar a técnica e a frequência de higienização e desinfecção dos aparelhos nebulizadores de pacientes com fibrose cística. **Métodos:** Trata-se de um estudo tipo corte transversal, que teve como instrumento de coleta um formulário para pacientes maiores de quatro anos acompanhados no ambulatório de pneumologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), com diagnóstico confirmado de Fibrose Cística e que utilizam da via inalatória para administração de medicamentos através de nebulizadores. **Resultados:** O estudo envolveu 27 pacientes, dentre os quais 88,9% realizavam limpeza do aparelho após o uso e 14,8% referiam higienizar uma vez ao dia. Quanto à forma de higienização e desinfecção dos nebulizadores, houve maior prevalência no uso de álcool a 70% e sabão neutro ou detergente, com 33,3% das respostas para ambas as formas, para os cenários de uso isolado ou os dois simultaneamente. 68% do percentual válido de entrevistados alegaram que não receberam quaisquer orientações de profissionais de saúde, pacientes/associação de familiares ou outros. **Conclusão:** O presente estudo demonstrou que a maior parte dos pacientes e responsáveis não receberam orientações sobre a limpeza dos aparelhos e peças, o que resulta no não cumprimento de uma padronização necessária para adequada higienização e desinfecção.

Palavras-chave: Fibrose Cística; nebulizadores e vaporizadores; infecções bacterianas; pseudomonas aeruginosa; microbiota.

O TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS COMO MÉTODO PARA A AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PORTADORES DE VALVOPATIA

Gabriela Cruz Santos

Evandro Cabral de Brito

RESUMO

Objetivos: Relacionar o Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M) com a repercussão nas atividades diárias dos portadores de cardiopatias valvares. **Método:** Estudo transversal realizado com portadores de cardiopatias valvares com idade acima de 18 anos atendidos no Ambulatório de Valvopatia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), sendo a coleta dos dados realizada entre os meses de novembro de 2022 e janeiro de 2023. A amostra foi obtida por conveniência, com coleta de dados através do questionário e da execução do TC6M. Realizou-se análise no programa R Software, sendo apresentados em forma de tabelas e gráficos com distribuição de frequência para as variáveis categóricas e medidas de distribuição para as variáveis contínuas. Por fim, foi realizada uma comparação entre os dados obtidos no TC6M, na Escala de New York Heart Association (NYHA) e de morbimortalidade. **Resultados:** A amostra foi composta por 86 pacientes, com idade de 18 a 87 anos, dentre estes 68,6% possuíam valvopatia devido a cardiopatia reumática; houve predomínio do gênero feminino com 53,48%; 39,8% eram eutróficos, 60,47% procedentes do interior de Pernambuco, 67,4% possuíam alguma comorbidade associada. De todos os avaliados 83,72% eram aposentados ou desempregados, destes, 56,97% apresentavam valvopatia de etiologia reumática. De todos os indivíduos analisados, cerca de 81,4% realizaram algum tipo de intervenção valvar, uma ou mais vezes. Observou-se que 39,5% foram classificados em grau 1 pela classificação funcional NYHA e 39,5% dos pacientes, em grau 2. Além disso, dentre os 86 pacientes, 48,8% apresentam elevado risco de morbimortalidade. **Conclusões:** Portanto, pode-se afirmar a capacidade do TC6M para avaliação clínica dos valvopatas, auxiliando na identificação da capacidade funcional, nível de morbimortalidade e repercussões das intervenções. Logo, é possível ratificar a necessidade de políticas públicas voltadas a intervenções educativas sobre a importância do diagnóstico precoce e adesão ao tratamento da cardiopatia reumática, além de incentivar novas pesquisas para análise dos benefícios individuais de cada tipo de intervenção, bem como a utilização do TC6M em consultas de rotina no ambulatório de Cardiologia.

Palavras-chave: morbimortalidade; teste de caminhada de seis minutos; atividades diárias e cardiopatia reumática

DEPRESSÃO PÓS-PARTO E SUPORTE SOCIAL EM PUÉRPERAS DE UM HOSPITAL REFERÊNCIA NO RECIFE: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Matheus Nascimento Selva

Alberto Gorayeb de Carvalho Ferreira

RESUMO

Objetivo: correlacionar o desenvolvimento de sintomas de depressão pós-parto (DPP) com o nível e tipo de suporte social recebido pela mulher durante a gestação. **Método:** Trata-se de um estudo transversal, de caráter quantitativo, em que foram entrevistadas 101 puérperas que receberam assistência ao parto entre dezembro de 2021 e janeiro de 2023 no Centro de Assistência à Mulher (CAM) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Pernambuco, Brasil. Foram aplicados instrumentos para avaliar a presença de sintomas depressivos após o parto (Escala de depressão pós-parto de Edimburgo - EPDS), o nível de suporte social recebido durante a gestação (Escala de Satisfação com o Suporte Social - ESSS), dados sociodemográficos e econômicos e dados obstétrico referentes às puérperas entrevistadas. **Resultados:** identificou-se a prevalência de sintomas de DPP em 23,8% das puérperas, além de médio e baixo suporte social durante a gestação em 37,6% das entrevistadas. Houve associação estatisticamente significativa entre as duas variáveis ($p = 0,004$). **Conclusão:** evidenciou-se a relação entre o desenvolvimento de sintomas de DPP com a presença de baixo ou médio suporte social recebidos pela puérpera durante a gestação. Além disso, gestação não planejada e problemas de saúde anteriores à gestação também se correlacionam com a ocorrência de DPP.

Palavras-chave: depressão pós-parto; puerpério; suporte social; gestação

MEDIDAS DE CONTROLE DA DOR EM MULHERES COM DOENÇA FALCIFORME ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA DE UM SERVIÇO DE SAÚDE EM RECIFE: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL

Mário Flávio Cordeiro Soares de Farias

Ariani Impieri de Souza

RESUMO

Objetivos: Avaliar as características e o manejo da dor em mulheres com doença falciforme (DF) atendidas em um ambulatório de ginecologia de um serviço de saúde em Recife. **Métodos:** Foi realizado um estudo observacional do tipo corte transversal no ambulatório de atenção à mulher com DF, no centro de atenção à mulher do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (CAM-IMIP) no período de dezembro de 2022 a setembro de 2023. A amostra de 62 mulheres foi de conveniência e sequencial. Foram avaliadas variáveis sociodemográficas (idade, escolaridade, raça/cor, estado civil, trabalho, número de gestações e uso de método contraceptivo) e clínicas (frequência, localização e intensidade das crises álgicas, manejo da dor, medicação para controle da dor, necessidade de tratamento, acesso à medicação e necessidade de atendimento ou internamento hospitalar pela dor). Os dados foram digitados em planilhas Excel® e analisados no programa Stata 12.1. Foram elaboradas tabelas de distribuição de frequência e de associação entre variáveis. Adotou-se o nível de significância de 5%. **Resultados:** Foram analisadas 62 mulheres com DF, das quais, 55(88,7%) com crise de dor nos últimos 6 meses. A média de idade foi de 36,1 anos, a maioria era solteira (58,1%), não exercia atividade remunerada (80,6%), da raça/cor parda ou preta (91,8%) e já tinham tido filhos (83,9%). Dentre as 55 (88,7%) que referiram crises álgicas nos últimos 6 meses, a maior proporção foi de crises mensais (33,9%), principalmente nas articulações de forma generalizadas (40%) e de moderada (23,6%) a forte intensidade (74,6%). A medicação de primeira escolha para as crises de dor foi o analgésico simples (59,7%) e a mais resolutive foi o anti-inflamatório não hormonal associado ao opióide (59,7%). Não houve associação entre a intensidade da dor e a medicação utilizada para a crise de dor ($p=0,783$). **Conclusão:** Este estudo mostra a complexidade da dor em mulheres afetadas pela doença falciforme, sublinhando a necessidade de uma abordagem de tratamento personalizada e individualizada. **Palavras-chave:** Doença falciforme; crise de dor; mulher; ginecologia

AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS DA SEDAÇÃO PALIATIVA EM PACIENTES EM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO NORDESTE DO BRASIL

Lucas Silvestre Araújo

Mecneide Mendes Lins

RESUMO

Objetivo: Avaliar os desfechos da sedação paliativa em serviço especializado no nordeste do Brasil. **Método:** Trata-se de um estudo transversal retrospectivo de caráter analítico. Foram incluídos pacientes hospitalizados na enfermaria de cuidados paliativos do Instituto de Medicina Prof. Fernando Figueira no período de janeiro a dezembro de 2021. A coleta de dados iniciou após aprovação do CEP-IMIP, respeitando os preceitos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas em seres humanos. **Resultados:** dos 140 pacientes analisados, a maioria correspondia ao sexo feminino, 72,9% procedentes da Região Metropolitana do Recife. Prevaleceu sedação a nível hospitalar (97,9%), com uso de haloperidol (66,4%), seguido do midazolam (25,7%). A via de administração predominante foi intravenosa (57,1%), subcutânea (35,7%) e oral (7,1%). Os sintomas refratários para sedação paliativa foram dor intensa (58,6%), dispneia (27,9%) e confusão mental (19,3%). Houve alívio dos sintomas em 121 pacientes, 103 foram a óbito, tendo progressão da doença como principal causa. **Conclusão:** O perfil dos pacientes e os elementos da sedação paliativa não divergem, na maioria dos critérios, do que está disposto na literatura. Apesar das limitações do estudo, este se fez importante para reconhecer os pacientes inseridos nos cuidados paliativos e suas necessidades, contribuindo para elaboração de ações preventivas e promoção da saúde, visando melhor assistência, sobrevida e prognóstico.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; hipnóticos e sedativos; midazolam; fim de vida; análise transversal

FATORES ASSOCIADOS AO BRINCAR DE PRÉ-ESCOLARES RESIDENTES EM UMA COMUNIDADE ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Lourdes Maria Pereira Marques Nascimento

Camila Fonseca Leal de Araújo

RESUMO

Introdução: A brincadeira é essencial para o desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo na primeira infância. O brincar pode envolver ou não brinquedos, estes estruturados ou não. Ao ar livre, as brincadeiras estimulam a participação ativa das crianças e as habilidades de integração sensorial. Todavia, há barreiras para encorajar e garantir o seu acesso igualitário. A Estratégia de Saúde da Família é necessária à promoção de saúde na infância, pois, ao acessar os cuidadores das crianças, viabiliza ações eficazes e de baixo custo, atuando como articulador do Sistema Único de Saúde. Há poucos estudos que explorem o livre brincar e o entendimento dos cuidadores, principalmente nos países em desenvolvimento. **Objetivo:** Avaliar os fatores associados ao brincar de pré-escolares residentes em uma comunidade de baixa renda. **Métodos:** Estudo transversal, envolvendo 35 responsáveis por 37 pré-escolares cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família em Recife-PE, identificados por conveniência. Utilizou-se formulário com o perfil biológico, socioeconômico e demográfico das crianças e cuidadores; características do brincar; afirmações no formato likert para compreender os conhecimentos dos cuidadores sobre o brincar. Para análise estatística, utilizou-se Epi-Info versão 7.1.3.10 (CDC, Atlanta) e STATA/SE 12.0. **Resultados:** Todas as cuidadoras entrevistadas eram mulheres e a maioria mães. 31,4% exerciam atividade remunerada. Quanto ao brincar ao ar livre, citou-se quintais e jardins, seguidos da rua de casa. As três maiores dificuldades foram violência, falta de tempo do cuidador e falta de local adequado. 90,1% dos brinquedos preferidos eram estruturados, e 20,8% destes eletrônicos. Questionando diretamente, apenas uma criança não utilizava eletrônicos. Todas concordaram que brincar faz bem para a saúde física e mental das crianças. Houve associação estatisticamente significativa ($p=0,017$) entre as cuidadoras que eram mães e que discordaram que brinquedos eletrônicos eram oferecidos porque ajudam na aprendizagem; entre as que não exerciam atividade remunerada e que concordaram que cuidadores evitam levar as crianças para brincar ao ar livre devido à violência nas ruas ($p=0,033$); e, ainda, entre as com renda inferior a um salário mínimo e que concordaram sobre os cuidadores evitarem levar as crianças para brincar ao livre devido à falta de espaços adequados ($p=0,031$). **Conclusão:** Brinquedos citados foram predominantemente estruturados.

Houve exposição excessiva a eletrônicos. A significância estatística encontrada demonstra a necessidade de reforçar importância de brincar ao ar livre e de reconhecer que há aspectos do ponto de vista de saúde pública que precisam ser considerados entre os fatores determinantes para o livre brincar. Palavras-chave: Jogos e Brinquedos; Desenvolvimento Infantil; Cuidadores; Atenção Primária à Saúde; Assistência Integral à Saúde da Criança.

Palavras-chave: jogos e brinquedos; desenvolvimento infantil; cuidadores; atenção primária à saúde; assistência integral à saúde da criança

USO DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE SANGUE INTRAOPERATÓRIO EM UM CENTRO DE GRANDE VOLUME DE CIRURGIAS CARDIOVASCULARES.

Arthur Alves Rodrigues Alencar

Verônica Soares Monteiro

RESUMO

Objetivos: avaliar a eficácia do uso do SRSI em pacientes submetidos a cirurgia cardiovasculares de grande porte com circulação extracorpórea. **Métodos:** este foi um ensaio clínico controlado e randomizado realizado entre setembro de 2022 e setembro de 2023. Os pacientes foram divididos em grupo intervenção: uso de SRSI no intraoperatório de cirurgias cardiovasculares com circulação extracorpórea e grupo controle: sem SRSI. **Resultados:** o grupo intervenção apresentou uma prevalência maior de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, mas não houve diferenças entre outras variáveis clínicas estudadas. O grupo intervenção também apresentou melhores níveis séricos de hemoglobina no 1º e 2º dias pós-operatórios. Não houve diferença em relação a outros desfechos cirúrgicos ou relacionados aos cuidados pós-operatórios analisados. **Conclusões:** o grupo de SRSI apresentou melhores níveis séricos de hemoglobina entre o primeiro e o segundo dia de pós-operatório. Entretanto, não foram percebidas diferenças em outros desfechos. Porém, trata-se de um estudo em andamento, e a continuação do estudo é fundamental para melhor análise.

Palavras-chave: Transfusão de sangue autóloga; procedimentos cirúrgicos cardiovasculares; respiração artificial; circulação extracorpórea

COLPOFIXAÇÃO SACROESPINHOSA TRANSGLÚTEA PARA CORREÇÃO DE PROLAPSO APICAL – PRODUÇÃO DE VÍDEO DEMONSTRATIVO DE TÉCNICA CIRÚRGICA MODIFICADA.

João Lucas dos Santos Matins

Aurélio Antônio Ribeiro Costa

RESUMO

Objetivo: Produzir e divulgar um vídeo informativo e explicativo acerca do procedimento de colpofixação sacroespinhosa por via transglútea com uso de tela de polipropileno com técnica adaptada, visando a capacitação da comunidade médico-científica sobre tal abordagem cirúrgica no tratamento de pacientes com prolapso apical. **Método:** Estudo prospectivo com produção de material audiovisual. **Resultados:** Vídeo demonstrativo da técnica cirúrgica empregada, com duração final de 9'23" (nove minutos e vinte e três segundos) após edição, que contemplou as etapas do procedimento de colpofixação sacroespinhosa transglútea para correção de prolapso apical, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP. **Conclusão:** A divulgação de técnica cirúrgica de baixo custo para correção de prolapso apical pode contribuir para a assistência de pacientes acometidas em cenários de poucos recursos disponíveis.

Palavras-chave: Prolapso de órgão pélvico; prolapso uterino; tela cirúrgica; recurso midiático; procedimentos cirúrgicos operatórios

DESFECHO MATERNO-FETAL EM GESTANTES E PUÉRPERAS INFECTADAS PELO COVID-19: EXISTE RELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA MATERNA? UM ESTUDO DE COORTE

Maria Eduarda Virgínia de Oliveira Correia

Leila Katz

RESUMO

Introdução: o sistema sanguíneo ABO, que já apresenta relação estabelecida com outras doenças, vem sendo associado à gravidade da COVID-19, porém poucos dados foram divulgados associando a classificação sanguínea com a gravidade da apresentação durante a gestação e o puerpério. **Objetivo:** o estudo investigou a relação entre o desfecho materno-fetal de gestantes infectadas pelo COVID-19 e a classificação sanguínea materna. **Método:** coorte retrospectivo realizado com dados secundários do projeto âncora "Preditores clínicos e laboratoriais da progressão da COVID-19 e desfechos maternos e perinatais em gestantes e puérperas infectadas em centros de referência dos estados de Pernambuco e Paraíba" e coleta de dados de pacientes admitidas de 2020 a 2022 em oito centros da região Nordeste do Brasil, com RT-PCR positivo para COVID-19. **Resultados:** foram avaliadas 562 pacientes, sendo 209 do tipo sanguíneo A (37,2%), 86 do tipo B (15,3%), 22 do tipo AB (3,9%) e 245 do O (43,6%). O grupo B teve maior associação com Near Miss Materno (NMM) [$p = 0,03$] e apresentou maior número de pacientes diabéticas que os demais grupos. O grupo AB apresentou menor número de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com dois casos (10%) versus 204 casos (38,8%) [$p = 0,009$]. **Conclusão:** o estudo demonstrou que o tipo sanguíneo B se associou a pior desfecho em gestantes e puérperas com COVID-19, apresentando taxas de NMM e Desfecho Materno Adverso (soma de morte materna e NMM) mais elevadas.

Palavras-chave: COVID-19; sistema ABO de grupos sanguíneos; gravidez

PREVALÊNCIA DE SOFRIMENTO MENTAL EM IDOSOS EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL ATENDIDOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO

Laura Helena Sousa de Medeiros

Djalma Feliciano dos Santos Junior

RESUMO

Objetivo: Analisar a prevalência de sofrimento mental e sua relação com isolamento social em idosos atendidos no ambulatório de geriatria do IMIP. **Métodos:** Trata-se de um estudo analítico longitudinal que utilizou 3 questionários para a coleta de dados de sua população alvo. Os instrumentos de avaliação incluem um questionário com variáveis sociodemográficas, Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) e a Escala de Redes Sociais de Lubben-6 (LSNS-6), instrumentos que já foram validados para a realidade brasileira. Para a análise dos dados todos os testes foram aplicados com 95% de confiança e os resultados foram apresentados em forma de tabela com suas respectivas frequências absoluta e relativa. **Resultados:** Participaram da pesquisa 52 idosos. Destes, as mulheres apresentaram taxa de sofrimento mental superior aos homens (65%). Também foi notado maior prevalência de sofrimento mental nos participantes acima de 70 anos (55%), naqueles com baixa renda salarial (70%) e pouca instrução educacional (65%). Percebeu-se que maioria dos voluntários se sentiam confortáveis para pedir ajuda à 4 familiares (70%). Notou-se ainda que maioria dos entrevistados não conseguem conversar com nenhum amigo (60%). **Conclusão:** Houve relação direta entre isolamento social e sofrimento mental do idoso. Assim, é necessária a implementação de políticas mais efetivas, para que os idosos não permaneçam desamparados, vivenciando a dura realidade da solidão.

Palavras-chave: isolamento social; saúde mental; idoso

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL EM CRIANÇAS DE UMA COMUNIDADE DE BAIXA RENDA: ESTUDO TRANSVERSAL

Maria Eduarda Raposo Asfora

Carla Adriane Fonseca Leal de Araújo

RESUMO

Objetivo: avaliar a prevalência da constipação intestinal funcional em crianças de uma comunidade de baixa renda da cidade do Recife-PE. **Métodos:** estudo transversal com 55 crianças entre 2 e 10 anos de idade (exclusive) e seus responsáveis em uma Unidade de Saúde da Família, de agosto/2022 a setembro/2023. A coleta de dados avaliou: aspectos socioeconômicos, demográficos, critérios Roma IV, hábitos alimentares, atividades físicas e tratamento farmacológico ou comportamental. Na análise considerou-se significativo o valor de $p < 0,05$. **Resultados:** dos 55 responsáveis: 51 (92,7%) eram do sexo feminino, 22 (40%) tinham ensino médio completo e 43 (78,2%) não trabalhavam. A média de idade foi $32 \pm 8,33$ anos. Em relação às crianças, 32 (58,2%) eram meninos, média de idade de $5,98 \pm 2,4$ anos, 32 (58,2%) não praticavam atividades física ou esportiva e 31 (56,4%) usavam tela por mais de 3 horas diárias. Sobre hábitos: 36 (65,5%) tinham ingestão de água e alimentação inadequadas. Dentre as 55 crianças, 34 (61,8%) apresentavam CIF e apenas 12 (25,5%) e 16 (29,1%) realizaram orientação comportamental ou medicamentos. Observou-se associação significativa entre constipação funcional, alimentação inadequada ($p=0,03$) e utilização de medicamentos ($p=0,02$). **Conclusão:** O atual estudo acrescentou novos dados sobre a prevalência da constipação intestinal na infância e identificou a importância da alimentação saudável na sua prevenção.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; criança; constipação intestinal; fatores de risco prevalência

AValiação da Retenção do Conhecimento sobre a Hanseníase em Adolescentes Menores de 15 Anos: Um Estudo de Intervenção.

Andreza Moreira Nogueira de Melo

Thaís Carine Lisboa da Silva

RESUMO

Objetivo: Estimar a retenção do conhecimento de adolescentes sobre a hanseníase depois da execução de uma intervenção educativa. **Método:** estudo de intervenção do tipo antes e depois conduzido a partir da realização de uma ação educativa em saúde com a população de adolescentes para analisar a retenção do conhecimento. A amostra contou com 64 estudantes de escolas públicas entre 11 e 15 anos da cidade do Recife. **Resultados:** No momento pré-intervenção a maioria dos alunos apresentou nível insuficiente de conhecimento (56,3%), seguido do grupo com conhecimento regular (23,4%). Após a realização da intervenção, houve maior prevalência de nível conhecimento ótimo (73,4%), seguido do grupo com conhecimento bom (15,6%). **Conclusão:** O nível de conhecimento foi alterado após a realização da intervenção, apontando a promoção em saúde no ambiente escolar como ferramenta para retenção de novos conhecimentos e quebra de estigmas.

Palavras-chave: Hanseníase; estigma social; intervenção; conhecimento; educação em saúde

É HISTO! AVALIAÇÃO DE PODCASTS SOBRE HISTOLOGIA EM PLATAFORMAS DE STREAMING COMO ALIADOS NA EDUCAÇÃO MÉDICA

Luciana Alcoforado Mendes Da Silva

Thiago Luiz de Almeida Silva

RESUMO

Introdução: A utilização de novas ferramentas pedagógicas, como uso de áudios em plataforma de streaming que facilitem o processo de ensino–aprendizagem é de grande importância no processo de construção do conhecimento, o que ficou ainda mais evidente no cenário de pandemia da COVID-19. **Objetivo:** Avaliar a qualidade, confiabilidade do conteúdo e métricas de desempenho de mídias de áudio disponíveis no canal É Histo! com conteúdos sobre histologia aplicados à graduação em medicina Métodos Estudo do tipo exploratório e descritivo realizado a partir da avaliação de mídias de áudios/podcasts disponibilizadas em plataformas de streaming de livre acesso disponíveis no canal “É Histo!”, desenvolvido no período de julho a outubro de 2023, em 3 etapas – Exploratória, Avaliação de confiabilidade e Avaliação das métricas de desempenho. A análise de dados foi realizada utilizando o software Microsoft Office Excel® 16.0 onde os dados foram tabulados e submetidos à análise quantitativa descritiva. **Resultados:** 14 podcasts analisados com conteúdo sobre Histologia. Ao avaliar confiabilidade do conteúdo observou-se maiores pontuações relacionadas nos quesitos 1, 2 e 3 e menor 4 e 7 baseada na DISCERN adaptada. **Conclusão:** É indispensável, a necessidade de maiores critérios para construção de conteúdos com melhor confiabilidade e qualidade da informação presentes nestas mídias digitais, bem como avaliação de sua divulgação.

Palavras-chave: Educação médica; tecnologia educacional; podcast; histologia; DISCERN

IMPACTO DO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME COMPRESSIVA EM TÚNEL OSTEO-FIBROSO AO NÍVEL DO CARPO NO BRASIL

Ana Luisa Ribeiro Peixoto

Jefferson Calume de Oliveira Junior

RESUMO

Introdução: A síndrome do túnel do carpo (STC) é uma neuropatia comum que resulta da compressão do nervo mediano no punho. A prevalência da doença é alta e pode chegar a 9,2% em mulheres e 6% em homens. A STC pode ser tratada com procedimentos cirúrgicos para descompressão do nervo mediano. No entanto, a pandemia da COVID-19 pode ter afetado a realização desses procedimentos devido à reorganização dos serviços hospitalares e ao medo dos pacientes de contrair o vírus. Este estudo tem como objetivo analisar o número de procedimentos para descompressão do nervo mediano realizados pelo SUS nos últimos anos, comparando com o período em que foram aplicadas medidas contra a COVID-19. O conhecimento desses dados pode fornecer informações valiosas sobre o impacto da pandemia na realização de cirurgias eletivas. **Objetivo:** Investigar o impacto das medidas de combate a Covid-19 na realização de procedimentos de descompressão cirúrgica em túnel osteo-fibroso ao nível do carpo. **Método:** O método utilizado neste estudo é observacional, transversal, quantitativo, descritivo e analítico. Foram coletados dados secundários do Sistema de Informações de Internação Hospitalar (SIHSUS) disponíveis no site do Departamento de Informações e Informática do SUS, DATASUS, referentes a todas as Autorizações de Admissão Hospitalar (HAA) para procedimentos relacionados ao tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel osteo-fibroso ao nível do carpo de janeiro de 2012 a dezembro de 2022. Não será necessária a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a submissão ao Comitê de Ética com Seres Humanos, já que os dados são coletados anonimamente. Todos os atendimentos cadastrados serão considerados como população de estudo, e a amostra será composta por todos os atendimentos cadastrados de janeiro de 2012 a dezembro de 2022. Os critérios de inclusão incluem atendimentos relacionados ao código de tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel osteo-fibroso ao nível do carpo, e os critérios de exclusão incluem atendimentos registrados em outro código. As variáveis independentes incluem idade, sexo, profissão, etnia, sinais presentes ao exame físico, membro acometido, acometimento de ambos os membros e presença de comorbidade, enquanto a variável dependente é o diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo definido pelo CID-10

G56.0. Os dados serão processados utilizando a ferramenta Microsoft Excel, e a análise dos dados será feita por meio de frequência relativa, frequência absoluta, média, mediana e desvio padrão. Não há previsão de riscos para os pacientes, e os benefícios serão indiretos, permitindo um melhor entendimento do impacto da pandemia na realização dos procedimentos cirúrgicos durante o período proposto e elucidando o número por região e estados da Federação.

Resultados: Em 2020, devido as medidas de enfrentamento a pandemia de COVID-19, ocorreu uma redução no número de procedimentos para descompressão do nervo mediano ao nível do carpo pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de 43,78% no Brasil como um todo. Uma análise por região apresenta mais detalhes sobre a redução de procedimentos. As regiões apresentaram, em média, quedas de 65,29% no Norte, 25,89% no Nordeste, 50,51% no Sudeste, 43,34% no Sul e 25,19% no Centro-Oeste. **Conclusão:** A pandemia de COVID-19 impactou na realização de cirurgias para descompressão do nervo mediano, com diferentes repercussões nas regiões do país, com maiores e menores níveis de declínio observados. No Sudeste, por exemplo, foi observado uma redução em média de 50,51%, devido principalmente a grande concentração populacional, já no Centro-Oeste, observou-se uma menor taxa de redução, com apenas 25,19%. Aspectos éticos: Por ser uma pesquisa com uso de dados coletivos, sem identificação individual dos pacientes nos bancos de dados, considerou-se desnecessária a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

Palavras-chave: Síndrome do túnel do carpo; pandemia; procedimentos cirúrgicos eletivos

CARDIOTOXICIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER TRATADOS COM ANTRACÍCLICOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Marcela Beatriz Alves Lopes
Maria do Carmo Menezes Bezerra Duarte

RESUMO

Objetivos: descrever o perfil clínico de crianças e adolescentes com câncer tratados com antraciclina com disfunção cardíaca pelo strain e cardiotoxicidade confirmada. **Métodos:** estudo descritivo, de corte transversal, realizado de maio de 2022 a setembro de 2023. Foram incluídos pacientes com câncer de zero a 18 anos após o tratamento com antracíclicos, do ambulatório de cardio-oncologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). Foram excluídos pacientes sem avaliação cardiológica durante o tratamento, pacientes com disfunção ventricular prévia e pacientes que não iniciaram tratamento no HUOC. Foram avaliadas frequência da cardiotoxicidade através da avaliação ecocardiográfica por fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), Strain Longitudinal Global e características clínico epidemiológicas. A coleta de dados utilizou formulário com variáveis biológicas e exames de imagem. A análise estatística utilizou medidas de tendência central e de dispersão. O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira e do HUOC. **Resultados:** Dos 143 pacientes avaliados, 88 apresentaram alteração de ecocardiograma, com Strain inferior a -20%. Destes, 14 casos foram confirmados como cardiotoxicidade. **Conclusão:** Afirma-se a importância do ecocardiograma com avaliação do Strain e da FEVE como rastreamento de cardiotoxicidade dos pacientes tratados com antraciclina, com avaliação antes, durante e após a intervenção quimioterápica.

Palavras-chave: Cardiotoxicidade; antraciclina; oncologia; pediatria

FREQUÊNCIA DE VACINAÇÃO E MOTIVOS PARA HESITAÇÃO VACINAL PARA COVID-19 ENTRE CUIDADORES DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL

Rafaella Galvão de Moraes

Fernanda Maria Ulisses Montenegro

RESUMO

Objetivos: Avaliar a frequência da vacinação contra a COVID-19 em crianças na faixa etária dos cinco aos 12 anos acompanhadas no ambulatório de Pediatria do Instituto de Medicina Integral Prof Fernando Figueira (IMIP). **Método:** Estudo de corte transversal com componente analítico realizado com 161 pacientes entre cinco e doze anos nos ambulatórios de Pediatria do IMIP durante a pandemia da COVID-19. As informações foram obtidas através de entrevistas com os participantes e confirmação do número de doses para vacina COVID-19 no cartão vacinal. **Resultados:** A frequência de estado vacinal completo para COVID-19 foi de 66,5%. Observou-se média de idade de 7,85 anos, com 56,5 % do sexo masculino. A maioria eram eutróficas (73,9 %), residiam na Região Metropolitana do Recife (63,6%) e 43,1% eram evangélicas, não sendo encontrada associação estatisticamente significativa entre essas variáveis e o esquema vacinal completo. Receber auxílio de programa social e renda mensal de até um salário mínimo mostrou associação estatisticamente significativa, com valor de $p = 0,025$ e $0,021$, respectivamente. Os motivos para não adesão ao esquema vacinal completo foram o medo dos efeitos adversos da vacina (37%), seguido pela necessidade de maiores informações sobre a vacina e/ou vírus (24%) e a falta de vacina no posto de saúde (13%). A impossibilidade de ir ao posto vacinar também foi um dos motivos citados pelos participantes para a ausência de vacinação completa (5,6%). **Conclusão:** Diversos fatores podem influenciar na adesão à imunização contra o COVID-19, sendo preciso desmistificar inverdades, orientar sobre o imunizante e a prevenção do vírus para que assim se chegue a uma cobertura vacinal satisfatória.

Palavras-chave: Imunização; infecções por coronavírus; crianças; vacinação

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E SOBREVIDA DE CRIANÇAS COM NEUROBLASTOMA: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL

Eduarda Coutinho Albuquerque Neiva Coêlho

Maria Júlia Gonçalves de Mello

RESUMO

Objetivos: Descrever o perfil clínico e epidemiológico e a sobrevida de pacientes portadores de neuroblastoma admitidos no serviço de oncologia pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) no período de 2005 a 2020. **Métodos:** Estudo transversal inserido em projeto âncora envolvendo 126 crianças menores de 18 anos diagnosticadas com neuroblastoma em serviço de referência em oncologia pediátrica no Nordeste do Brasil entre 2005 e 2020. Foram analisadas variáveis sócio-demográficas, clínicas, laboratoriais e de evolução através do programa Stata 13.0 e calculada a probabilidade de sobrevida global no método Kaplan-Meier. **RESULTADOS:** A mediana de idade dos participantes em meses foi de 26,5, com predomínio em brancos (41,2%) e no sexo feminino (59,5%). As características mais frequentes foram: presença de febre (44,4%), sítio primário em adrenal (52,4%), metástases em medula óssea (46,8%), estágio INSS 4 (61,1%), histologia desfavorável e MYCN negativo. Óbitos ocorreram em 65% dos pacientes, com sobrevida global em cinco anos de 32,4%. **Conclusão:** O diagnóstico do Neuroblastoma é um desafio em países de baixa e média renda pelas limitações referentes ao diagnóstico e à classificação de risco da doença, com baixa chance de cura. São necessários mais estudos que avaliem o perfil desses pacientes, permitindo um melhor manejo da neoplasia e uma menor letalidade e maior sobrevida global nesses países.

Palavras-chave: Neuroblastoma; oncologia; fatores epidemiológicos; prognóstico; sobrevida

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE RECIFE

Daniel Cabral Ribeiro da Silva

Suely Arruda Vidal

RESUMO

Introdução: O uso de ventilação mecânica é um procedimento muito frequente no âmbito das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (1), estando relacionado ao desenvolvimento de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS), mais especificamente, Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).^{1,2,3,4} A PAV é definida como a presença de uma infecção no parênquima pulmonar que ocorre dois dias ou mais após a colocação do ventilador mecânico no paciente.^{4,5} É importante ressaltar que os pacientes sob ventilação mecânica (VM) possuem um risco elevado de ter as vias aéreas infectadas com material contaminado, que se deve, principalmente, ao rebaixamento do nível da consciência e a presença do tubo traqueal. Os critérios brasileiros para diagnóstico de PAV foram divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2019 em nota técnica, que traz critérios clínicos e microbiológicos para o diagnóstico da PAV para as diversas faixas etárias. ¹⁰ O diagnóstico clínico é dado pela associação de parâmetros cronológicos, radiológicos, ventilatórios e sinais e sintomas. O tratamento medicamentoso da PAV é baseado na administração de antibióticos específicos para o agente etiológico em cada caso, mediante culturas. **Objetivos:** Descrever o perfil dos pacientes acometidos por Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica na UTI pediátrica do IMIP nos anos de 2019 e 2020. **Métodos:** Foi realizado um estudo de série de casos de PAV notificados no Centro de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) nos anos de 2019 e 2020. Foram revisados os prontuários médicos dos 20 pacientes incluídos no estudo, sendo as variáveis de análise registradas em planilha eletrônica, e posteriormente estatisticamente analisadas e apresentadas na forma de tabelas e gráficos. **Resultados:** Foi identificado maior acometimento no sexo masculino (60%), com pico de incidência no primeiro trimestre de vida. Os pacientes em sua maioria apresentaram febre (60%) e alterações na ausculta respiratória (58%) como manifestações clínicas, associados a achados laboratoriais de leucocitose e elevação de PCR. Identificou-se como principais causadoras da PAV em nosso centro as espécies *P. aeruginosa*, *S. aureus* e *S. Haemolyticus*, sendo as penicilinas de largo espectro a classe antimicrobiana mais empregada. **Conclusões:** É imperativo a realização de

mais estudos, incluindo um número maior de pacientes, para melhor definição dos padrões de patógenos, apresentações clínicas e radiológicas.

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; pneumonia associada ventilação mecânica; pediatria; antibacterianos; agente infeccioso

ESTADIAMENTO PATOLÓGICO DOS TUMORES COLORRETAIS E A CORRELAÇÃO RADIOLÓGICA DE METÁSTASES PULMONARES: QUEM SE BENEFICIA DA TOMOGRAFIA DE TÓRAX?

Felipe Neves Baptista Moura

Cristiano Souza Leão

RESUMO

Introdução: Com a finalidade de evidenciar metástases pulmonares, as diretrizes atuais recomendam a utilização de TAC de tórax na rotina do estadiamento do câncer colorretal. Contudo, a eficácia desse método de imagem na rotina de estadiamento vêm sendo questionada, visto que os casos de metástase pulmonar frequentemente advém de tumores T3/T4, com linfonodos positivos e/ou com metástase hepática. Além disso, o achado de lesões pulmonares indeterminadas, onde a maioria é posteriormente comprovada como benigna, é comum. Contudo, após realização de extensa revisão de literatura, percebe-se que a literatura nacional acerca desse tema é bastante escassa. Desse modo, esse estudo visa identificar a prevalência e fatores de risco de metástase pulmonar no câncer colorretal. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo. **Resultados:** A amostra foi composta por 53 pacientes. A metástase pulmonar ocorreu em 4 participantes (7.5%); desses, 75% apresentavam metástase hepática associada ($p = 0,018$). Apenas um participante manifestou metástase pulmonar isolada (1.9%). Todos os casos de metástase pulmonar apresentavam tumor primário T3. 24.4% evidenciaram lesões pulmonares indeterminadas; 25% dessas se comprovaram como benignas, 50% se mantiveram indeterminadas e 25% evoluíram para malignidade. Conclusão: Os dados foram concordantes com a literatura, podendo-se reiterar que a TAC de tórax deve ser reservada aos pacientes com tumores de alto risco para metástases pulmonares. No entanto, são necessários mais estudos multicêntricos no Brasil acerca desse assunto, visando evitar exames desnecessários, ansiedade, radiação e intervenções invasivas dispensáveis.

Palavras-chave: câncer colorretal; metástase; tomografia; estadiamento de neoplasias

A VIVÊNCIA DA VIOLÊNCIA EM MULHERES: UM ESTUDO DE CORTE TRANSVERSAL

Vinícius Eduardo Ferreira da Silva

Mônica Cristina Batista de Melo

RESUMO

Cenário: A presente pesquisa aborda a violência contra a mulher, fenômeno que se manifesta em diferentes âmbitos e apresenta-se como uma das principais formas de violação dos direitos humanos. **Objetivo:** Analisar a vivência, tipologia e aspectos desencadeadores da violência em mulheres. **Método:** Trata-se de um estudo observacional de corte transversal, com mulheres a partir de 18 anos. A coleta de dados foi realizada através de questionário elaborado pelos pesquisadores, utilizando a estratégia Snowball Sampling para recrutamento das participantes. Os dados obtidos foram analisados de forma descritiva. **Resultados:** Responderam à pesquisa 325 participantes de 18 a 67 anos. 61,23% das participantes se reconhecem como vítima de violência psicológica, seguida pela violência moral com 41,54%, violência física com 29,23%, violência sexual com 26,15% e violência patrimonial com 16%. **Conclusão:** Emerge do presente estudo que as mulheres reconhecem a violência pela via da descrição comportamental, mas apresentam dificuldade de identificá-la conceitualmente. Assim, evidencia-se a necessidade de ações de prevenção e promoção de saúde para propiciar reconhecimento da violência e seus tipos, educação continuada, incentivo de mídia e políticas públicas neste sentido. O estudo é subproduto de uma pesquisa de mestrado realizada através da combinação de métodos quantitativo (corte transversal) e qualitativo (análise de entrevistas).

Palavras-chave: Violência contra a mulher; violência; violência de gênero; mulheres; promoção da saúde

DOAR SANGUE, DOAR VIDA: CONHECIMENTOS E MOTIVAÇÕES ACERCA DA DOAÇÃO DE SANGUE EM ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO NORDESTE BRASILEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Maria Eduarda Cândido Lopes

Jailson de Barros de Correia

RESUMO

Objetivo: Investigar as percepções, a motivação e os conhecimentos acerca da doação de sangue em estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). **Métodos:** Estudo transversal realizado entre outubro de 2022 e agosto de 2023 na FPS, em Recife-PE. A amostra foi composta por 330 estudantes, entre 18 e 43 anos de idade, do 1º ao 12º períodos de todos os cursos de saúde da FPS. Para a coleta, foram utilizados formulários para a verificação dos dados socioeconômicos e demográficos, além de perguntas do questionário internacional Brazilian Blood Donation Knowledge Questionnaire (BDKQ-Brazil). **Resultados:** Dentre os 330 estudantes, 254 (77%) eram do sexo feminino e a idade mais prevalente nas respostas era em torno de 21 anos. Quanto aos conhecimentos sobre o processo de doação de sangue, a maioria dos alunos respondeu corretamente o questionário BDKQ-Brasil, em uma média de 74,9% de acertos. Quanto ao questionário sociodemográfico, cerca de 199 (60,3%) alunos são de medicina, 236 (71,5%) se autodeclararam brancos, e 241 (73%) nunca realizaram doação de sangue dentro do campus da FPS, nas ações do Projeto de Extensão Corrente do Bem. Quanto às motivações para a doação de sangue, 239 (72,4%) alunos já incentivaram alguém a doar sangue, 280 (84,8%) relataram que já viram campanhas de doação de sangue nos diversos meios de comunicação e cerca de 196 (59,4%) alunos afirmaram se sentir motivados a doar sangue, mas sem ser por motivos de benefícios próprios, como um dia de folga do trabalho ou isenção em taxas de concursos públicos. **Conclusão:** O estudo evidenciou que o acesso à informação que tange à doação de sangue é um fator essencial para a captação de doadores. Diante disso, é inexorável a necessidade da abordagem do tema “doação de sangue” durante a graduação das instituições de ensino de saúde.

Palavras-chave: Doação de sangue; motivação; estudantes de saúde

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAS SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Camilla Victoria Ribeiro Santana

Jurema Telles de Oliveira Lima

RESUMO

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida relacionada a saúde (QVRS), com ênfase na função sexual em mulheres com câncer do colo do útero submetidas a tratamento oncológico no IMIP.

Métodos: Estudo descritivo, tipo corte transversal, envolvendo mulheres entre 18 e 70 anos que concluíram o tratamento de câncer de colo uterino no IMIP. Avaliaram-se a função sexual (FSFI), a qualidade de vida em geral do paciente oncológico (EORTC QLQ-C30), e a qualidade de vida no climatério (Menopause Rating Scale). Após, feita análise no programa R, sendo os resultados apresentados em tabelas. **Resultados:** Entre 50 pacientes entrevistadas, foi obtida uma pontuação média de $20,49 \pm 4,2$ no FSFI, com a menor média em "desejo" e a maior em "orgasmo". A qualidade de vida geral média foi de $66,7 \pm 20,89$, com melhor perspectiva em "desempenho de papel" e "função física", e pior em "função emocional". Nos sintomas, predominaram "insônia" e "dor". Sobre sintomas climatérios, destacaram-se os psicológicos, com maior média na MRS entre sexualmente ativas sem disfunção e menor naquelas com disfunção. **Conclusão:** A análise revela que a disfunção sexual, em "desejo" e "excitação", é influenciada pela autoimagem pós-tratamento. Também, a "satisfação" não depende apenas do orgasmo. Mulheres pós-câncer enfrentam desafios emocionais, com inter-relação entre sintomas climatéricos e disfunção sexual. A abordagem integral é crucial.

Palavras-chave: Câncer de colo de útero; qualidade de vida; saúde sexual

IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D NO CONTROLE DA DOR, FADIGA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO: SÉRIE DE CASOS E REVISÃO DA LITERATURA

Bernardo Ferreira de Vasconcelos Hartmann

Ligia Cristina Câmara Cunha

RESUMO

Introdução: O câncer de próstata (CaP) é o segundo tipo mais comum de câncer e a quinta causa mais comum de morte relacionada ao câncer em homens no mundo¹. A metástase óssea ocorre em 65-80% dos pacientes com câncer de próstata avançado, sendo a principal causa de dor em pacientes com câncer. Complicações de metástases ósseas incluem dor, diminuição do estado de desempenho e diminuição da qualidade de vida (QV), bem como eventos relacionados ao esquelético (SREs). A vitamina D é um hormônio esteróide importante para o metabolismo do cálcio e a manutenção da saúde óssea. Estudos experimentais com pacientes adultos com câncer sob cuidados paliativos que receberam suplementação de vitamina D demonstraram impacto na qualidade de vida, como melhora do controle da dor e redução da fadiga^{8,10}. **Relato de caso:** Apresentamos os casos de cinco pacientes com diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea, recebendo terapia de privação androgênica, com ou sem quimioterapia, que realizaram suplementação de vitamina D na dose 400 UI/dia durante 30 dias para controle da dor, fadiga e qualidade de vida. Concomitantemente à suplementação de vitamina D, os pacientes receberam 120 mcg vitamina K2 e 500mg magnésio dimalato. **Conclusão:** A presente revisão integrativa sugere que a suplementação adequada de vitamina D pode trazer benefícios ao paciente oncológico, auxiliando no controle de diversos sintomas e contribuindo para a melhora na qualidade de vida e conforto do paciente, principalmente em casos em que há deficiência. Entretanto, é necessário o desenvolvimento de mais estudos na área, para que seja afirmada a segurança e aplicabilidade dessa terapia, fornecendo um melhor cuidado ao paciente oncológico em cuidados paliativos.

Palavras-chave: Câncer de próstata; vitamina D; metástase óssea; fadiga; dor; qualidade de vida

FATORES ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Lucas Torres dos Reis

Eduardo Jorge Abrantes da Fonte

RESUMO

Introdução: A saúde mental e a qualidade de vida são assuntos de grande relevância nos dias de hoje. No entanto, frequentemente subestimamos a importância desses temas quando se trata da população idosa, especialmente daqueles que residem em instituições de longa permanência. Com isso em mente, o objetivo do presente estudo consistiu em analisar, por meio de uma revisão integrativa, os fatores que exercem influência sobre a qualidade de vida dos idosos que vivem nessas instituições. Observou-se que interação social, manutenção de vínculos familiares, atividade física e lazer, liberdade de ir e vir, maior independência e ausência de limitações para atividades básicas de vida diária aliadas a boas condições de vida são alguns dos fatores cruciais para a manutenção da saúde mental e conseqüentemente para o incremento da qualidade de vida desses idosos. Faz-se necessário, então, a inclusão de atividades que estimulem com frequência esses fatores de proteção no dia a dia dos idosos institucionalizados.

Palavras-chave: Qualidade de vida; saúde mental; idoso; instituição de longa permanência

AVALIAÇÃO DE SINTOMAS DE ANSIEDADE ENTRE ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO: UM ESTUDO DESCRITIVO

Marco Antônio Mattos de Moraes

André Furtado de Ayalla Rodrigues

RESUMO

Objetivos: Descrever a prevalência de sintomas de ansiedade entre atletas de futebol americano das Seleções Brasileiras masculina e feminina de futebol americano, em 2022, associando a dados sociodemográficos, atléticos e de saúde. **Métodos:** Estudo epidemiológico observacional descritivo do tipo transversal. Dados coletados pela autoaplicação online de questionário autoral e da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, entre março e agosto de 2023, após aprovação da pesquisa pelo comitê de ética. Foram incluídos atletas dos times Brasil Onças e Brasil Onças Feminino, durante a temporada de 2022 e excluídos aqueles com idade inferior a 18 anos. Aprovado pelo Comitê de Ética do IMIP em 26/10/2022 (CAAE: 64582622.9.0000.5569). **Resultados:** Dos 61 atletas avaliados, 34 não apresentaram sintomas de ansiedade (55,7%), ao passo que 27 apresentaram sintomas de ansiedade (44,3%). **Conclusão:** A alta prevalência de sintomas de ansiedade encontrada na população estudada, associada a carência de estudos similares para comparação efetiva dos resultados encontrados, reitera a importância da ampliação de estudos a respeito do tema. É válido reafirmar que essa pesquisa se trata de um projeto pioneiro no Brasil, devido a abordagem de um nicho pouco estudado, fornecendo, portanto, uma base de dados para os clubes e a federação, além de contribuir para o desenvolvimento e profissionalização da modalidade no país.

Palavras-chave: Atletas; ansiedade; esportes; futebol americano; saúde mental

ETIOLOGIA E SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS DAS BACTÉRIAS ISOLADAS EM UROCULTURAS DE MENORES DE 5 ANOS ATENDIDOS EM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE REFERÊNCIA

Alice Pimentel Venícius Silva

Maria Júlia Gonçalves de Mello

RESUMO

Objetivo: Determinar etiologia e sensibilidade antimicrobiana dos uropatógenos em menores de 5 anos. **Métodos:** Estudo tipo corte transversal realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira-IMIP, a partir da análise de resultados de uroculturas de março de 2021 a março de 2023 armazenados no banco de dados do Laboratório de Análises Clínicas. Excluiu-se os menores de 30 dias, uroculturas com mesmo microrganismo e sensibilidade antimicrobiana em menos de 30 dias. As variáveis avaliadas foram sexo, idade, setor de coleta. Considerou-se urocultura positiva o crescimento de microrganismo único com mais de 100.000 colônias/ml. Utilizou-se critérios do Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (BrCAST) para identificação e teste de sensibilidade automatizados. Para análise estatística empregou-se o Stata 13.0®. **Resultados:** Analisou-se 610 uroculturas de 425 pacientes, sendo mais prevalentes *Escherichia coli* (44,3%), *Klebsiella pneumoniae* (16%), *Pseudomonas aeruginosa* (10%), *Proteus mirabilis* (9,8%) e outros Gram-negativos (13,1%). Gram-positivos representaram 4,7%, predominando *Enterococcus faecalis* (3,7%). *Candida albicans* foi mais prevalente na Unidade de Terapia Intensiva (2,3%). A *E. coli* demonstrou sensibilidade superior a 95% a Carbapenênicos, Amoxicilina com Clavulanato, Nitrofurantoína e Amicacina; sensibilidade inferior a 60% à Cefuroxima e sulfametoxazol/trimetoprim. **Conclusão:** Alta sensibilidade dos Gram-negativos à Amoxicilina com Clavulanato sugere sua possível escolha no tratamento empírico das infecções do trato urinário em crianças.

Palavras-chave: Crianças; infecções urinárias; resistência microbiana a antibióticos; testes de sensibilidade microbiana

A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Larissa Lucena Freire

Eneline de Andrade Heraclio Gouveia Pessoa

RESUMO

Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica acerca da influência da pandemia do Covid-19 no desenvolvimento infantil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico, descritivo, tipo revisão integrativa, englobando os artigos publicados nos últimos três anos (2020 a 2023). **Resultados:** A análise de 11 publicações revelou que o isolamento social resultante da pandemia de Covid-19 trouxe alterações importantes na rotina e no ambiente das crianças, exercendo um impacto direto no seu desenvolvimento, abrangendo aspectos sociais, emocionais, cognitivos e linguísticos. **Conclusão:** de acordo com os dados obtidos no estudo, foi possível perceber que a pandemia do Covid-19 ocasionou modificações significativas na rotina e no ambiente das crianças, impactando diretamente no desenvolvimento infantil, seja nos âmbitos sociais, emocionais, cognitivos ou linguísticos. É indispensável atenção contínua dos profissionais de saúde a esse público. Além de necessários mais estudos para avaliar esse impacto a longo prazo.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; pandemia; Covid-19

NUTRIÇÃO

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E DA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE INDIVÍDUOS LGBTQIAPN+ NO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA

Yasmin Martins Aguiar

Lígia Pereira da Silva Barros

RESUMO

Introdução: Estressores sociais sofridos pelas múltiplas identidades de gênero e orientações sexuais ditam como a forma corporal é vista, representando forte correlação com o risco de comportamentos disfuncionais e transtornos alimentares. **Objetivo:** Avaliar a percepção da imagem corporal e prevalência de comportamentos alimentares transtornados na comunidade LGBTQIAPN+ do Recife e Região Metropolitana. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de estudo transversal quantitativo, com amostra obtida por conveniência do tipo não probabilística. A pesquisa foi aprovada pelo CEP-FPS, com coleta de dados via Google Forms. Aplicou-se três questionários: Socioeconômico; TFEQ-R21 e BSQ. Considerou-se significância estatística ($p < 0,05$). **RESULTADOS:** Amostra de 160 participantes com idade média de $28,4 \pm 8,78$ anos, 51,3% sexo masculino, 92,5% cisgêneros e 58,1% homossexuais. IMC médio de $26,8 \text{ kg/m}^2$ e classe social B2 (38,75%). Prevalência da Alimentação Emocional (AE) no TFEQ-R21. No BSQ, 43,8% apresentaram insatisfação corporal. Verificou-se correlação entre Restrição Cognitiva (RC) e não binários ($p = 0,019$) e associação entre BSQ e TFEQ-R21, especialmente AE ($p < 0,001$). Observou-se relação entre Descontrole Alimentar (DA) e AE ($p < 0,001$). **Discussão:** AE despontou como principal domínio afetado e houveram distorções leves a graves na imagem corporal. RC acometeu não-binários, com redução da ingestão alimentar. Evidenciou-se influência entre comportamento alimentar e imagem corporal, principalmente AE, que também mostrou ser o principal responsável pelo DA, impactando no aumento de peso. Gêneros e sexualidades fluidas apresentaram fragilidade na autoimagem e comportamento alimentar. **Conclusão:** Apesar das limitações e escassez de artigos, o trabalho apresentou importantes desdobramentos sobre imagem corporal e comportamentos alimentares de risco dessas minorias.

Palavras-chave: Comportamento alimentar; imagem corporal; minorias sexuais e de gênero

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS CARDÁPIOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE UMA CRECHE DE RECIFE-PE

Débora Cardoso Rabello

Cibele Maria Rocha

RESUMO

Introdução: A alimentação desempenha um papel crucial em todas as fases da vida, especialmente na infância. Durante a idade escolar, os hábitos alimentares são formados e tendem a persistir ao longo da vida adulta. Por isso, a promoção de uma alimentação saudável e a educação nutricional adequada para crianças têm sido temas de grande importância nas últimas décadas. A escola desempenha um papel fundamental nesse processo, sendo um local de apoio e aprendizado para a promoção da saúde e nutrição. A Constituição Federal do Brasil garante o direito à alimentação adequada e saudável desde 1988, levando em consideração a cultura e tradição local. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é responsável por oferecer alimentação escolar e promover a educação nutricional em todas as etapas da educação básica pública. O objetivo deste estudo descritivo e transversal é analisar qualitativa e quantitativamente os cardápios planejados para crianças de 1 a 3 anos em uma unidade de alimentação e nutrição de creche localizada em Pernambuco durante um trimestre. O estudo tem por fim observar a frequência de alimentos nos cardápios, o aporte energético e avaliar o nível de processamento dos alimentos oferecidos. Os cardápios referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2023 foram obtidos e analisados de acordo com as exigências do PNAE. O Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN) foi utilizado para analisar os indicadores quantitativos e qualitativos dos cardápios, considerando a composição diária e semanal das refeições. Os cardápios analisados ofereciam 5 refeições por dia, incluindo café da manhã, almoço, jantar e lanches da manhã e tarde. Eles apresentaram uma quantidade adequada de frutas, verduras, alimentos do grupo de leite e derivados, cereais, raízes, tubérculos, feijão, carnes e ovos. Não foram encontrados alimentos ultraprocessados nos cardápios, demonstrando preocupação com a saúde alimentar. Os cardápios também valorizaram alimentos regionais, promovendo a cultura e a alimentação local, além de apoiar os pequenos agricultores e o comércio local. No entanto, a análise do IQ COSAN revelou uma certa monotonia alimentar em relação às frutas, verduras e legumes, com pouca variação ao longo dos meses. Recomenda-se diversificar as preparações oferecidas, utilizando diferentes formas de apresentação das frutas. Além disso, é importante especificar

os legumes e verduras nos cardápios, tanto por questões de controle de alergias e intolerâncias, quanto para promover a conscientização das famílias sobre uma alimentação.

Palavras-chave: Alimentação; infância; escola; saúde; nutrição; cardápios

RELAÇÃO ENTRE SINAIS E SINTOMAS DE DISBIOSE INTESTINAL E ESTILO DE VIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Maria Fernanda Guedes De Albuquerque Melo

Fernanda Camila Ferreira Da Silva Calisto

RESUMO

A disbiose intestinal, quadro de desequilíbrio da microbiota, favorece o surgimento de patologias diversas. Seu desenvolvimento ocorre por diferentes causas, destacando-se estresse psíquico, dieta, sedentarismo e privação de sono. Esta pesquisa objetivou relacionar os sinais e sintomas de disbiose intestinal com o estilo de vida de estudantes universitários durante a pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo analítico de corte transversal, realizado entre setembro a dezembro de 2022. A coleta dos dados ocorreu através de três instrumentos: Questionário Sociodemográfico, Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM) e Questionário Convid – Pesquisa de Comportamentos, ambos adaptados. Participaram 656 acadêmicos com 52% atingindo pontuação indicativa de hipersensibilidade alimentar. A média das idades foi de 21 anos e o público foi majoritariamente feminino (79,2%). Os resultados evidenciaram que, em relação às mudanças no estilo de vida do grupo classificado com disbiose, a maioria relatou problemas de sono durante a pandemia. Além disso, os sentimentos de tristeza e depressão, como também a percepção de ansiedade e nervosismo mostraram-se em alta incidência. Esses dados se equipararam com a recorrência do retorno ao consumo de bebida alcoólica e com o elevado tempo de uso de telas por esse grupo. Foi evidenciado também que não houveram diferenças significativas entre os grupos quanto à dieta e prática de atividade física. Diante dos achados, concluiu-se que a pandemia da COVID-19 impactou a vida dos estudantes favorecendo o quadro de disbiose. Para tanto, adaptações na realidade universitária são interessantes para se atingir vitalidade positiva e aumentar o rendimento acadêmico.

Palavras-chave: COVID-19; disbiose; estilo de vida; estudantes

IMPACTO DO VESTIBULAR NO COMPORTAMENTO E QUALIDADE ALIMENTAR DE ESTUDANTES RECÉM-FORMADOS NO ENSINO MÉDIO

Luiza Coutinho Brasil de Azevedo

Ligia Pereira da Silva Barros

RESUMO

Cenário: Os jovens que passam pela preparação para o vestibular estão sujeitos a alterações em sua alimentação devido ao cenário de alta competitividade de potencial ansiogênico, podendo levar a escolhas inadequadas. **Objetivo:** Observar a influência do ano de vestibular no comportamento e qualidade alimentar dos estudantes recém-formados no ensino médio, que prestaram vestibular e ingressaram em uma instituição de ensino superior privado. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo. A pesquisa foi realizada em uma instituição privada de ensino superior localizada na cidade do Recife, onde os dados foram coletados por meio de um questionário online disponibilizado para o grupo amostral. **Resultados:** No total, 22 estudantes responderam ao questionário, com maior proporção de participantes do curso de medicina (36,4%), seguido pelo curso de nutrição (27,3%), odontologia (13,6%), psicologia (13,6%) e farmácia (9,1%). Foi possível identificar impactos nos hábitos de sono, estudo, alimentação e saúde mental dos estudantes durante o período de preparação para o vestibular. **Conclusão:** É fundamental reconhecer a importância do suporte emocional e estratégias de enfrentamento para estudantes nessa fase desafiadora, além de promover uma alimentação saudável para cuidar de sua saúde física e mental.

Palavras-chave: Comportamento alimentar; ansiedade; escolha da profissão

AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO FÚNGICA EM CONDIMENTOS COMERCIALIZADOS A GRANEL NA CIDADE DO RECIFE – PE

Ana Carolina Ribeiro do Nascimento

Fabiana Lima de Melo

RESUMO

Condimentos ou temperos são definidos pela legislação brasileira como produtos compostos de partes de uma ou mais espécies vegetais tradicionalmente utilizadas para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. A compra desses produtos a granel é bastante popular, embora este tipo de comercialização possa trazer riscos de contaminação biológica devido a maior exposição do produto. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade microbiológica de condimentos comercializados a granel, na cidade de Recife, Pernambuco, quanto a presença de fungos. Para tanto, onze amostras foram adquiridas em lojas especializadas no comércio a granel e submetidas a análise microbiológica para investigação de fungos, conforme protocolo estabelecido pelo Compendium of Methods for Examination of Foods. Todas as amostras analisadas apresentaram contaminação fúngica, sendo o alho frito o resultado mais agravante (290×10^3 UFC). Diante do exposto, faz-se necessário maior fiscalização dos órgãos competentes visando reduzir os riscos à saúde humana, tendo em vista que alguns fungos são produtores de micotoxinas.

Palavras-chave: Fungos; contaminação de alimentos; doenças transmitidas por alimentos

PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DISBIOSE INTESTINAL EM INDIVÍDUOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DO RECIFE

Camila de Carvalho Gomes

Derberson Jose Do Nascimento Macedo

RESUMO

Introdução: A microbiota intestinal, composta principalmente por bactérias dos filos Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobactérias e Actinobactérias, desempenha um papel crítico na integridade da barreira intestinal. Desequilíbrios na microbiota, conhecidos como disbiose, podem levar a inflamação e aumento da permeabilidade intestinal. O lipopolissacarídeo (LPS), um metabólito bacteriano, pode desencadear inflamação sistêmica, contribuindo para a resistência à insulina e diabetes tipo II. Doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e câncer, estão intimamente ligadas a esses desequilíbrios. **Objetivo:** Avaliar a prevalência de sinais e sintomas de disbiose intestinal em indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis atendidos no ambulatório de Nutrição do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP. **Métodos:** Foi realizado um estudo transversal, realizado no Ambulatório de Nutrição do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) durante 2022 e 2023, foram incluídos participantes com 18 anos ou mais com diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis, excluindo mulheres grávidas. Foram coletados dados socioeconômicos, antropométricos e aplicado o Questionário de Rastreamento Metabólico do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional (QRM) e o Questionário de Critérios para Diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável, com base nos Critérios de Roma IV, adaptado pelos pesquisadores. Para avaliar possíveis indícios de disbiose intestinal. Os dados foram analisados utilizando software estatístico SPSS, com testes estatísticos apropriados, e o estudo foi conduzido após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do IMIP, com consentimento informado dos participantes. **Resultados:** A amostra do estudo foi constituída por 49 pacientes, adultos e idosos, com uma média de idade de 49 anos ($\pm 13,7$ DP), de ambos os sexos, sendo 83,7% do sexo feminino, da classe social C2 e que apresentavam majoritariamente a hipertensão arterial sistêmica como doença crônica não transmissível, a análise antropométrica revelou uma prevalência de sobrepeso e obesidade. Houve correlação significativa entre o estado nutricional (IMC) e a presença de múltiplas doenças crônicas. Pacientes hipertensos apresentaram sobrepeso ou obesidade em 96,8% dos casos. Foram encontradas uma correlação estatisticamente significativa entre o rastreamento metabólico e o registro de dores abdominais.

Da mesma forma, o rastreamento metabólico foi associado a uma maior frequência de evacuações. Conclusão: O baixo percentual indivíduos saudáveis (18,4 %) de acordo com o QMR e a elevada incidência de obesidade na amostra analisada, em conjunto com a correlação entre obesidade e hipertensão, destaca a necessidade premente de abordagens abrangentes e eficazes em políticas de saúde pública para enfrentar esse problema de forma efetiva. Além disso, os resultados relacionados à disbiose intestinal introduzem uma perspectiva inovadora sobre a obesidade e suas condições metabólicas associadas, enfatizando a importância de investigações adicionais para uma compreensão mais profunda dessas complexas interações.

Palavras-chave: Doenças crônicas não transmissíveis; microbioma gastrointestinal; disbiose

TRAÇOS DE ANSIEDADE E COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM PACIENTES COM HIV/AIDS ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL DE PERNAMBUCO

Yasmin de Miranda Aguiar

Bruno Soares De Sousa

RESUMO

Introdução: Com o surgimento dos primeiros casos na década de 80, a infecção causada pelo vírus da Imunodeficiência Humana ficou conhecida como AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A AIDS é considerada um problema de saúde mundial, onde a maioria dos acometidos encontram-se em países em desenvolvimento que não apresentam recursos financeiros para ações de prevenção e tratamento. A doença é causadora de inúmeros fatores negativos, como as alterações nutricionais, sobrepeso, ansiedade, depressão, afetando diretamente na qualidade de vida e inclusão social desses pacientes na vida comunitária. Esses efeitos irão interferir na mudança de comportamento alimentar do paciente. **Objetivo:** identificar as alterações no comportamento alimentar e os traços de ansiedade e sua relação com o estado nutricional em pacientes soropositivos para HIV/AIDS. **Método:** Trata-se de um estudo analítico de corte transversal. Foram obtidas as características demográficas e clínicas, parâmetros antropométricos e bioquímicos. Na avaliação da ansiedade foi usado o questionário IDATE T e quanto ao comportamento alimentar foi usado o HAQTol. **Resultados:** No estudo com 64 pacientes, os principais resultados deste foram: predominância de pacientes do sexo feminino, com uma média de idade de 42,2 anos. A Maioria dos pacientes apresentou valores abaixo do adequado na classificação da CD4 e CD8. Quanto ao estado nutricional, foi observado um predomínio de eutrofia, conforme o índice de massa corporal e circunferência da cintura. Mais da metade dos pacientes com HIV/AIDS demonstraram traços de ansiedade em níveis médios, totalizando 87,10%, de acordo com o questionário IDATE T. Houve um predomínio de 58,6% de comportamento alimentar externo, relacionado à desinibição ou perda de controle causada por fatores externos, intrínsecos aos alimentos ou à situação social em que são consumidos, de acordo com o QHCA. Foi observada uma correlação significativa entre o índice de massa corporal e sintomas e ansiedade ($P < 0.05$). **Conclusão:** A população deste estudo apresentou associações significativas entre os parâmetros clínicos e antropométricos com a ansiedade traço. Além disso, os benefícios desse acompanhamento estão associados à melhor evolução clínica e redução de complicações e acarretam na qualidade de vida.

Palavras-chave: Estado nutricional; HIV/AIDS; ansiedade; comportamento alimentar

ASSOCIAÇÃO DE FATORES EXTERNOS E RISCO DE PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ADOLESCENTES DE ESCOLA PARTICULAR DE RECIFE/PE

Maria Cecília Corrêa de Araújo Pedrosa de Melo

Lígia Pereira da Silva Barros

RESUMO

Introdução: Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, com abordagem quantitativa, que associou os fatores externos e o risco de prevalência de transtornos alimentares em adolescentes de escolas particulares de Recife/PE. Foram entrevistados 60 adolescentes, de ambos os sexos, com idades de 14 a 17 anos. Eles responderam questionários com informações sociodemográficas e antropométricas e o instrumento Eating Disorder Inventory (EDI-3), utilizado para avaliar a presença/risco de transtorno alimentar. Os resultados encontrados destacaram as associações entre gênero, estado nutricional e as subescalas do instrumento, sendo de maior incidência um índice de massa corporal, com uma maior pontuação para risco das subescalas. Os dados concluíram que esses estudantes podem ser um grupo de risco, visto que eles estão expostos diariamente a fatores externos que influenciam no desenvolvimento de transtornos alimentares, sinalizando a importância de implementar estratégias de prevenção e aumentar a conscientização.

Palavras-chave: Adolescente; comportamento alimentar; transtorno alimentar

DISTORÇÃO DA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL DE UNIVERSITÁRIOS DE SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DO NORDESTE BRASILEIRO

Yasmin Fonseca Pimentel

Derberson Jose do Nascimento Macedo

RESUMO

Introdução: A Imagem Corporal (IC) é a figura percebida a respeito da forma e tamanho do corpo, sua percepção é resultado de um conjunto de sentimentos a respeito dessas características. **Objetivo:** correlacionar a percepção da imagem corporal com o estado nutricional em universitários de cursos de saúde de uma instituição privada do nordeste brasileiro. **Materiais e métodos:** foi realizado um estudo transversal e descritivo, para coleta dos dados foi necessária a autorização prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição proponente e a mesma ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2023. Foram aplicados os instrumentos Body Shape Questionnaire (BSQ) e escala de silhuetas corporais proposta por Stunkard et al. (1983). **Resultados:** a amostra foi composta por 209 estudantes maiores de 18 anos dos cursos de saúde, sendo a maioria do sexo feminino. Foi constatado que 56,7% das mulheres desejavam um corpo mais magro segundo a escala de silhuetas, enquanto 42,4% dos homens desejavam uma silhueta maior que a percebida. Também foi evidenciado que 66% dos universitários afirmaram que a sua aparência corporal exercia influência na prática profissional. Houve correlações estatisticamente significantes entre o instrumento aplicado para avaliação do grau de satisfação corporal, o BSQ e a faixa etária. **Conclusão:** no estudo mais da metade dos estudantes apresentaram preocupação e possível insatisfação corporal, mesmo as pessoas com estado nutricional de eutrofia, alertando para um quadro de distorção corporal e possível grupo de risco para desenvolvimento de Transtornos Dismórficos Corporais (TDC). **Palavras-chave:** Estado nutricional; estudantes de ciências da saúde; imagem corporal; transtornos dismórficos corporais.

ADEQUAÇÃO DIALÍTICA E ESTADO NUTRICIONAL DE NEFROPATAS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO

Lucas Henrique Wanderley Catanho

Samanta Siqueira de Almeida

RESUMO

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde, que afeta milhões de pessoas. A hemodiálise tem se destacado como um tratamento eficaz para pacientes com DRC em falência renal. Porém, apesar das vantagens, esse procedimento também apresenta desvantagens, como a má adequação dialítica acarreta em risco nutricional para o paciente.

Objetivo: Relacionar o estado nutricional de pacientes nefropatas em hemodiálise com a adequação dialítica. **Métodos:** Este estudo trata-se de um recorte de uma pesquisa maior, de natureza transversal e prospectiva, desenvolvida entre os meses de junho e novembro de 2021. A pesquisa foi realizada com adultos e idosos em tratamento no serviço de hemodiálise do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos, bioquímico, antropométricos e espessura do músculo adutor do polegar. A análise dos dados foi realizada pelo Software SPSS v 13.0. Ao fim, somente variáveis com um valor de $p < 0,05$ foram consideradas estatisticamente significativas. **Resultados:** a maioria dos indivíduos são adultos, do sexo feminino, tendo os maiores percentuais das doenças de base HAS e DM. A ureia pré-diálise mostrou-se reduzida em 39,4% dos avaliados. O IMC apresentou menor percentual de indivíduos classificados como baixo peso, os demais parâmetros evidenciaram percentuais importantes de indivíduos em situação de desnutrição. Observamos correlação estatisticamente significativa, no grupo adulto, para peso seco, altura e EMAP e no grupo idoso para peso seco e IMC. **Conclusão:** Pacientes em hemodiálise estão predispostos a uma série de distúrbios nutricionais, que podem ser potencializados se os tratamentos dialítico e dietético não forem otimizados. Dessa forma, enfatiza-se a importância da avaliação e acompanhamento nutricional contínuo para a prevenção e/ou minimização de danos nos pacientes hemodialíticos.

Palavras-chave: Diálise renal; estado nutricional; desnutrição

IMPACTO DA DIETA CETOGÊNICA NO PERFIL LIPÍDICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EPILEPSIA FÁRMACORRESISTENTE EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO NORDESTE

Juliana de Freitas Coutinho

Larissa de Andrade Viana

RESUMO

Objetivo: Avaliar o impacto da dieta cetogênica no perfil lipídico de crianças e adolescentes com epilepsia farmacorresistente em hospital de referência. **MÉTODOS:** Tratou-se de um estudo observacional, do tipo corte transversal, envolvendo pacientes do Ambulatório de Terapia Cetogênica em um hospital de referência. A população do estudo foi composta por crianças e adolescentes, de ambos os sexos, diagnosticados com epilepsia farmacorresistente. A partir da análise retrospectiva dos dados foi comparado, condições clínicas de base, a média de crises por dia, os níveis séricos do perfil lipídico (Colesterol, LDL, HDL e Triglicerídeos), número de medicamentos e o estado nutricional de todos os pacientes antes e depois do tratamento com a dieta cetogênica por 1 ano. **Resultados:** Amostra foi composta por 32 crianças, com predominância do sexo feminino, com idade entre 6 meses e 18 anos, que apresentaram uma mediana de idade de 82 meses. Avaliando as condições clínicas de base, foi evidenciado que a Síndrome de West e causas desconhecidas foram as mais prevalentes. Os níveis séricos de colesterol total, HDL, LDL tiveram uma alteração após 1 ano fazendo uso da DC. Seus valores apresentaram um aumento em relação ao seu valor inicial. O triglicerídeo foi o único parâmetro que retornou aos valores iniciais. **Conclusão:** Os resultados obtidos ao longo desta pesquisa sugerem que a DC é eficaz na redução das crises convulsivas. Conclui-se que os valores crescentes de CT e LDL ao final do primeiro ano, podem ser minimizados por fármacos auxiliares e melhores fontes de gordura.

Palavras-chave: Dieta cetogênica; epilepsia resistente a medicamentos; estado nutricional

FATORES ASSOCIADOS AO GANHO PONDERAL EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO

Cybelly Maria de Almeida

Jullyana Flávia Da Rocha Alves

RESUMO

Objetivo: Identificar os fatores associados a evolução ponderal em crianças hospitalizadas em um serviço de referência de Pernambuco. **Métodos:** Estudo longitudinal descritivo, cuja coleta de dados ocorreu de janeiro a julho de 2023 na Clínica Médica Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP. Foram coletadas variáveis sociodemográficas, clínicas e antropométricas de 33 crianças com idades entre 1 mês e 10 anos de idade hospitalizadas. Os dados foram digitados e armazenados em planilha do programa Microsoft Excel e a sua análise ocorreu no software SPSS versão 23.0. **Resultados:** A maior parte da amostra era do sexo masculino e com média de idade de 44,4 meses ($\pm 43,07$ DP), sendo a faixa etária mais comum entre 5 a 10 anos. O principal motivo de internamento compreendeu patologias metabólicas e nutricionais, sendo o tempo médio de hospitalização foi de 21,54 dias. Na admissão, a maioria estava eutrófica e essa tendência se manteve na última reavaliação. Observou-se ainda uma correlação significativa entre as classificações iniciais e as últimas para peso/idade (P/I), estatura/idade (E/I) e índice de massa corporal/idade (IMC/I). Os índices de P/I e E/I diminuíram ao longo do internamento, enquanto o escore de IMC/I aumentou. **Conclusão:** Embora a maior parte da população se manteve eutrófica no início e ao final do internamento hospitalar, os valores de escore-Z apresentaram uma variação importante ao longo do internamento devido possivelmente à uma adaptação ao ambiente hospitalar. Assim, é pertinente destacar que, considerar somente a avaliação do estado nutricional com base nos valores de escore-Z pode não ser suficiente, pois conforme verificado, tais valores oscilam bastante e a indicação e início precoce de terapia nutricional, por exemplo, pode vir a ser considerada somente quando a desnutrição já estiver estabelecida.

Palavras-chave: ganho de peso; estado nutricional; nutrição enteral; pediatria

ODONTOLOGIA

DEPRESSÃO E AUTOESTIMA DE IDOSOS COM PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS

Amanda Rago Constantino Martins

Mônica Soares de Albuquerque

RESUMO

Objetivo: Avaliar o edentulismo e como ele afeta a saúde mental de idosos, além de conhecer as características sociodemográficas dos idosos edêntulos, relacionando o edentulismo com episódios depressivos e com a autoestima. **Metodologia:** Estudo observacional, do tipo transversal, descritivo e analítico, realizado em um hospital de atenção à pessoa idosa, com idosos acima de 60 anos, em Recife-PE. Os dados foram coletados entre setembro de 2022 e agosto de 2023 a partir de um formulário sociodemográfico, da Escala de Autoestima de Rosenberg e da Escala de Depressão Geriátrica. A pesquisa atende aos postulados da Declaração de Helsinki e às normas para pesquisas com seres humanos preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde através da resolução nº 466/12 e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP). **Resultados:** Foram analisados dados de 188 idosos com edentulismo superior e inferior dos dentes anteriores sendo equivalente a 96,8% e 78,1% respectivamente. Em relação à prótese dentária, 70,7% fazia uso de prótese superior e 39% fazia uso de prótese inferior. 53,7% dos entrevistados tinham uma autoestima elevada, 59,5% com ausência de sintomas depressivos e 36,2% idosos com suspeita de depressão leve. Foi identificado que indivíduos com edentulismo inferior possuíam uma autoestima mais baixa. **Conclusão:** A saúde bucal tem influência no bem-estar do idoso, podendo ter efeitos na sua autoestima. Portanto, é importante a existência de uma abordagem integrada, com cuidados de saúde mental, reabilitação odontológica e apoio social para idosos.

Palavras-chave: Idosos; arcada edêntula; autoimagem; depressão; impacto psicossocial

DESAFIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORAL MENOR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SOB A PERSPECTIVA DO ODONTOPEDIATRA, CLÍNICO GERAL E CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL.

João Bezerra Lyra Neto

Rebeca Luiz de Freitas

RESUMO

Objetivo: Conhecer os desafios para o manejo de pacientes odontopediátricos na realização de cirurgia oral menor sob a perspectiva do clínico geral, do cirurgião buco-maxilo-facial e do odontopediatra. **Metodologia:** Foi um levantamento feito através de questionário projetado para este fim. A amostra consistiu em profissionais graduados em Odontologia devidamente inscritos e regulares no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco e que atuassem como clínico geral, odontopediatra ou cirurgião buco maxilo-facial. O trabalho foi feito de acordo com os postulados da Declaração de Helsinki e às normas para pesquisas com seres humanos preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde através da resolução nº 466/12 e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados:** A amostra final foi composta por 231 cirurgiões-dentistas. Dos 80 odontopediatras participantes, apenas 8,7% declararam não ter dificuldades para realização do atendimento, e 10% declararam ter dificuldades de comunicação com o paciente, apesar da expertise. Dos 72 clínicos gerais, 29,1% concordaram que sua maior dificuldade é ganhar a confiança do paciente infantil. Dos 79 cirurgiões buco-maxilo-faciais, 44,3% identificaram como maior dificuldade controlar o medo do paciente, enquanto apenas 6,3% afirmaram não ter dificuldades no atendimento odontológico de pacientes infantis. **Conclusão:** É válido ressaltar que novas pesquisas abordando o perfil sociodemográfico e as atuais tendências dos cirurgiões-dentistas atuantes devem ser realizadas, além de trabalhos que investiguem às complicações e acidentes relacionados a não aplicabilidade das técnicas de manejo comportamental do paciente infantil, uma vez que a literatura apresenta poucos artigos científicos com dados atualizados.

Palavras-chave: Cirurgia bucal; comportamento da criança; prática profissional

EPIDEMIOLOGIA DA CÁRIE DENTÁRIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM FISSURA LABIOPALATINA EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA

Jullia Maria Fernandes Julião
Maria de Fatima Pessoa Araújo Sabino

RESUMO

Objetivos: Avaliar a saúde bucal dos pacientes pediátricos com fissuras labiopalatinas, na faixa etária de 32 a 65 meses, tratados no Centro de Atenção aos Defeitos da Face do IMIP (CADEFI), antes e após a pandemia da Covid-19. **Métodos:** Estudo observacional, transversal e descritivo, incluindo uma avaliação da epidemiologia da cárie dentária em pacientes pediátricos com fissura labiopalatina. Foram utilizados dados secundários coletados dos prontuários dos pacientes atendidos no CADEFI, localizado no estado de Pernambuco, Recife, durante o período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP (CAAE: 63969322.8.0000.5201).

Resultados: Foram analisados dados de 57 pacientes com fissuras labiopalatinas. A amostra foi composta por 57,9% crianças do sexo masculino e 42,1% do feminino. Quanto à classificação das fissuras 26,3% tinha fissura pré-forame, 49,1% transforame e 24,6% pós-forame. Em relação ao índice ceo-d, houve uma média de 0,05 na primeira avaliação e 0,21 na segunda avaliação. Na segunda análise pós-pandemia, os incisivos superiores se destacaram como os mais afetados no que diz respeito ao índice CEOD. **Conclusões:** Evidencia-se a necessidade da atenção à saúde bucal de crianças com fissuras labiopalatinas, além de ações preventivas, para que, haja o controle da doença cárie e uma diminuição do índice ceo-d, como também serviços que foquem a reabilitação desses pacientes.

Palavras-chave: Atendimento odontológico; pandemia; pacientes pediátricos; fissuras labiopalatinas

CONDIÇÃO PERIODONTAL E O USO DO CIGARRO ELETRÔNICO: UM ESTUDO TRANSVERSAL

Clara Armindo Farias

Rebeca Luiz de Freitas

RESUMO

Objetivo: Identificar a prevalência de usuários de cigarro eletrônico (CE) e a condição de saúde periodontal de estudantes de graduação em saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde. **Métodos:** O estudo do tipo transversal analítico e descritivo. Foi realizado o convite aos estudantes para avaliação da saúde periodontal, e aqueles que compareceram à Clínica, responderam um questionário com perguntas a respeito do uso do CE. Posteriormente, foi realizado o Registro Periodontal Simplificado (RPS) para avaliação da saúde periodontal. Garantida a confidencialidade acerca dos dados coletados através da codificação do RPS e do questionário. Os dados foram analisados, através do SPSS versão 23. **Resultados:** Serão apresentados dados parciais, pois a pesquisa ainda está em fase de coleta. A amostra foi composta de 27 estudantes, 85,2% do sexo feminino, a maioria com renda familiar mensal maior que 3 salários mínimos. Observou-se que 11,1% já teve diagnóstico de doença periodontal. A prevalência de usuários de cigarro eletrônico encontrada foi de 33,3%. Sobre a condição periodontal, 22,2% apresentaram gengivite e 3,7% periodontite. **Conclusões:** Os resultados podem representar mais um artefato estatístico do que uma medida de associação epidemiológica. Apesar das limitações, foi possível realizar uma análise da prevalência de usuários de cigarro eletrônico no curso de Odontologia, além de suas condições de saúde periodontal.

Palavras-chave: Tabagismo; cigarro eletrônico; doenças periodontais

INFLUÊNCIA DO LOCAL DE ORIGEM SOBRE O TRATAMENTO ORTODÔNTICO DE PACIENTES COM FISSURA LABIOPALATINA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM PERÍODO PANDÊMICO.

Nayara Evelin Gomes Silva De Lima

Manoela Almeida Santos Da Figueira

RESUMO

Objetivo: Avaliar a influência do local de origem sobre o tratamento ortodôntico de pacientes com fissura de um centro de referência em anomalias craniofaciais em período pandêmico. **Métodos:** Tratou-se de estudo observacional, quantitativo, descritivo e transversal utilizando dados secundários anonimizados de pacientes em tratamento ortodôntico do CADEFI no período de 2019 a 2021. Foram consideradas variáveis sociodemográficas, clínicas, de tratamento ortodôntico e acesso. Criou-se a variável “cidade de origem em km” a partir da variável “procedência” para fins de análise. A análise de dados foi realizada utilizando os Softwares SPSS 25.0 e Excel. Empregou-se testes de Kolmogorov-Smirnov para as quantitativas, teste de Mann-Whitney e teste de Spearman's, além da criação de cenário geográfico utilizando Power BI. **Resultados:** A amostra compreendeu 173 participantes, sendo a maioria do gênero feminino (N=90, 52%) e oriundos de Recife-PE (N= 62, 37,2%). A fissura predominante foi lábiopalatina unilateral (N=68, 39,3%) e a média de idade foi 20,9 anos (D.P. 8,84). A média do número de consultas foi menor em 2020. A maior dificuldade de acesso foi em 2020, sendo o motivo a marcação. No ano de 2019, a distância, refletiu no acesso ao serviço, enquanto nos outros anos não houve diferença significativa. **Conclusão:** O local de origem não representou fator relevante quanto à dificuldade de acesso em 2020, no entanto a distância entre a residência e o centro de referência foi significativa em 2019 com relação ao acesso ao serviço. **Palavras-chave:** COVID-19; ortodontia; fissura palatina; fenda labial

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DO TRAUMA FACIAL

Larissa Rodrigues Soares

Silvia Carréra Austregésilo Rego

RESUMO

Introdução: o estudo analisou dados epidemiológicos de pacientes com traumas bucomaxilofaciais atendidos em um hospital de referência em Pernambuco. Utilizando informações de prontuários de pacientes maiores de 18 anos internados no setor de Traumatologia do Hospital da Restauração entre 2020 e 2022, foram registrados dados como consumo de álcool, idade, gênero e a Pontuação da Severidade do Trauma (FISS). A tabulação dos dados foi realizada no software Excel, versão 365 e a análise dos dados através do software Statistical Package for the Social Sciences-SPSS, versão 26.0. Dos 236 pacientes analisados, a maioria era do gênero masculino (93,2%) e tinha entre 26 e 40 anos (45,7%). A maioria dos pacientes residia na Região Metropolitana do Recife (38,1%), e 42,4% deles apresentaram sinais de alcoolemia. O acidente de motocicleta foi a causa mais comum de trauma facial (47,5%). Em relação às fraturas faciais, as mais frequentes foram Le Fort 2 (31,4%), CZO esquerdo (30,5%) e direito (30,1%). O trauma facial relacionado ao consumo de álcool teve prevalência notável entre homens na faixa etária de 26 a 40 anos. O fator etiológico primordial, o acidente motociclístico, destaca-se, especialmente na região do Agreste. Isso enfatiza a importância da cooperação entre profissionais de saúde, autoridades de trânsito e a sociedade na prevenção desses acidentes e traumas.

Palavras-chave: Face; traumatismo; abuso oral de substâncias; índices de gravidade do trauma

DOENÇA PERIODONTAL NA GRAVIDEZ E A OCORRÊNCIA DE PARTO PREMATURO E BAIXO PESO AO NASCER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Milena Raysa da Silva

Cândida Augusta Rebêlo de Moraes Guerra

RESUMO

Objetivo: Avaliar a associação entre a ocorrência de doença periodontal (DP) na gravidez, parto prematuro e baixo peso no nascimento. **Métodos:** trata-se de um estudo retrospectivo utilizando dados secundários. Na coleta de dados foram utilizados prontuários de pacientes acima de 18 anos de idade, sendo mulheres gestantes e puérperas atendidas no ambulatório de odontologia do IMIP no período de outubro de 2022 a abril de 2023, os quais tiveram informações registradas em uma ficha padronizada. A tabulação dos dados foi realizada no software Excel, versão 16.0, enquanto a análise dos dados foi realizada por meio do software R versão 4.0.0. Além disso, foi aplicado o teste de qui-quadrado para verificar a relação entre as variáveis. A pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, através da Plataforma Brasil (CAAE 71492123.0.0000.5569). **Resultados:** Entre as 59 pacientes avaliadas, a maioria (93.2%) estava na faixa etária entre 20 e 59 anos. Quanto à ocorrência de DP, 33.9% das pacientes apresentavam essa condição. Observou-se que 12.6% tiveram parto prematuro e 23.7% apresentaram pré-eclâmpsia. Das gestantes que não tiveram parto prematuro, 27.5% apresentaram DP, enquanto das gestantes que tiveram parto prematuro 75% foram diagnosticadas com essa condição. A maioria dos bebês (84.7%) nasceu com peso normal, enquanto 13.6% nasceram abaixo do peso, desses, metade das mães tinha DP durante a gestação. **Conclusão:** os resultados aqui observados reforçam a importância da atenção odontológica durante a gravidez, sugerindo a necessidade de estratégias de prevenção e intervenção para mitigar os riscos associados à saúde bucal materna e neonatal. Ações como a implementação de programas de saúde bucal em unidades de atenção pré e pós-natal auxiliam na garantia do acesso das gestantes aos cuidados odontológicos adequados, de modo a reduzir ou evitar possíveis complicações durante a gestação.

Palavras-chave: Pré-termo; baixo peso ao nascer; doença periodontal; gravidez

BANCO DE DENTES HUMANOS: O QUE DOCENTES E DISCENTES SABEM SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Juliana Luchsinger

Thiago Luiz de Almeida Silva

RESUMO

A criação de um Banco de Dentes Humano (BDH) é de suma importância para o fortalecimento do aprendizado dos acadêmicos dos cursos de odontologia nas instituições de ensino superior. A utilização do órgão dental é uma prática exercida por diversas especialidades odontológicas incluindo a anatomia dentária, endodontia, dentística, dentre outras. Sua utilização é de cunho pedagógico e científico, mas a aquisição dos órgãos dentais para tais fins ainda é feita por meio de práticas ilegais, infringindo as leis que reconhecem o elemento dentário como um tecido humano. A estruturação e a implementação de um BDH coíbem e (ou) inibem a comercialização dos elementos dentários suprimindo as necessidades acadêmicas e contribuindo para a formação ética e profissional dos estudantes de odontologia.

Palavras-chave: Banco de tecidos; obtenção de tecidos e órgãos; dente; bioética; curso de odontologia

PSICOLOGIA

PERCEPÇÃO DAS MULHERES EM RELAÇÃO A AUTOIMAGEM E O MACHISMO ESTRUTURAL EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM PERNAMBUCO

Maitê Samico Lacerda

Eduarda Pontual Santos

RESUMO

Introdução: Buscou se compreender as implicações do machismo estrutural na percepção da autoimagem das mulheres. Optou se pela abordagem de coorte transversal, qualitativo e exploratório, com mulheres de 19 a 25 anos em um ambulatório referência na assistência à saúde da mulher, no período de janeiro a fevereiro de 2023. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada, audiogravada e transcritas. A análise dos dados foi orientada pela técnica de análise de conteúdo feita por Bardin. A amostra incluiu 10 mulheres, com idade média de 21,8 anos e todas se declararam como pretas ou pardas. Das dez participantes, uma é transexual e nove são cisgênero. As categorias revelaram, por meio dos relatos das mulheres, que elas reconhecem a existência do machismo, porém com um distanciamento dos atravessamentos dele em suas vidas. Também se constatou uma carência de conscientização sobre a relevância da autoimagem, e um olhar mais atento para essa dimensão da psique feminina. Identifica-se que há um longo caminho a percorrer na compreensão desse fenômeno, como também em estratégias dos profissionais de saúde na prevenção e intervenção no cuidado da saúde da mulher.

Palavras-chave: Violência de gênero; autoimagem; mulher; sexismo

RESSIGNIFICAÇÃO DA VIDA A PARTIR DA CONSCIÊNCIA DE FINITUDE: UMA ANÁLISE DO FILME "ANTES DE PARTIR".

Rebecca Patrícia Silva de Vasconcelos

Maria Angélica Bezerra de Oliveira

RESUMO

A resignificação da vida permite que o indivíduo se torne consciente de seu processo de finitude e a partir dele atribua um sentido para sua vida. Sendo esse sentido um movimento predominantemente espiritual, a noção dinâmica, visto que o ser humano é uma unidade tridimensional constituída por fatores biológicos, psicológicos e espirituais. A análise de filmes dentro do ambiente acadêmico permite aguçar o senso crítico e reflexivo do sujeito, além de trazer contribuições para os estudos e interpretações teóricas. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo analisar de forma crítica o filme “Antes de Partir”, partindo da consciência de finitude como forma de resignificar a vida. Foi optado pela pesquisa qualitativa, utilizando o método Mascarello que consiste em oito passos: identificação do autor do filme, apresentação da obra, descrição da estrutura, escrita sobre o conteúdo, análise. Articulou-se a obra com o referencial teórico interligado com os temas encontrados no filme para verificar a influência da consciência de finitude no processo de resignificar a vida.

Palavras-chave: Morte; consciência; luto; cuidados paliativos; cuidados paliativos na terminalidade da vida

PERFIL CLÍNICO E SOCIODEMOGRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM UM SETOR PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO RECIFE/PE, BRASIL

Renata Alves Rodrigues Ferreira

Monica Cristina Batista de Melo

RESUMO

Este estudo analisou o perfil clínico, sociodemográfico e o processo de Avaliação psicológica realizado com crianças e adolescentes atendidos no Laboratório de Avaliação Psicológica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP (LAP). Foram concluídas 25 avaliações entre os anos de 2019 e 2022. Os participantes tinham média de idade no momento da triagem de $8,16 \pm 2,58$, sendo a maioria do sexo masculino. 13 pacientes não faziam uso de medicamentos psicotrópicos e os psicólogos foram os profissionais responsáveis pela maioria dos encaminhamentos para o setor. No processo de Avaliação, foram utilizados 16 instrumentos, entre eles Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção, Figuras Complexas de Rey e Materiais Lúdicos. Os resultados apontaram que mais da metade dos pacientes apresentou dificuldades aritméticas, seguido de desatenção, dificuldades na escrita e comportamento desafiador. O transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade foi a hipótese diagnóstica mais identificada, seguido da Deficiência Intelectual. A Avaliação Psicológica é um importante instrumento para contribuir junto à equipe interprofissional na identificação das dificuldades de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Crianças; adolescentes; desenvolvimento neuropsicológico; avaliação psicológica

REPERCUSSÕES DA MÁ QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Caroline Cosme e Silva

Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa

RESUMO

O sono é um processo fisiológico necessário aos seres humanos. Um adulto deve dormir em média sete a oito horas por dia e a falta de sono afeta processos cognitivos e de aprendizagem. Estudantes universitários geralmente sofrem de privação do sono devido a grandes demandas acadêmicas, e fatores como consumo excessivo de álcool, cafeína, tabaco, internet e comportamentos alimentares inapropriados. O presente estudo visa compreender as repercussões da má qualidade do sono em estudantes universitários e analisar os artigos publicados sobre a temática. Foi realizada uma revisão sistemática, utilizando os descritores "estudantes" AND "sono" AND "saúde mental", nas bases de dados BVS, Scielo, PubMed Central, incluindo artigos publicados entre 2018 e 2023 em português. No Google Acadêmico, foram incluídos artigos publicados somente em 2023. Ao todo, houveram apenas seis artigos elegíveis para serem analisados, sugerindo a necessidade de mais artigos acerca do tema.

Palavras-chave: Sono; estudantes universitários; sonolência diurna; qualidade do sono e privação do sono

BILINGUISMO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA INFÂNCIA: UM GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA PAIS

Fernanda Gouveia da Fonte

Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa

RESUMO

Introdução: O bilinguismo, caracterizado pelo domínio de duas línguas por um indivíduo, é um fenômeno global de relevância. Este trabalho apresenta um guia para pais interessados no tema, destacando a evolução das percepções sobre o impacto do bilinguismo no desenvolvimento cognitivo. Nos dias de hoje a definição de "bilíngue" abrange um espectro mais amplo de habilidades linguísticas, desafios podem surgir, independentemente do contexto linguístico, e o guia explora como o bilinguismo influencia a cognição e a neuroplasticidade funcional. Diferenças entre crianças bilíngues e monolíngues são cruciais e o estudo enfatiza o envolvimento positivo dos pais no desenvolvimento da segunda língua de seus filhos, promovendo um ambiente bilíngue equilibrado que enriquece tanto o aspecto cognitivo quanto o social e cultural das crianças. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi desenvolver um guia para orientar os pais sobre a importância do bilinguismo e sua relação com o desenvolvimento cognitivo na infância. **MÉTODO:** O guia foi construído em um modelo de design instrucional, composto por cinco etapas segundo o método ADDIE, que significa: análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação, que representa as cinco fases do processo de criação do material. As partes da implementação e avaliação não foram realizadas no por não fazerem parte do presente trabalho. **Resultado e Discussão:** A versão final do produto resultou em um guia de orientação para os pais com base em 17 artigos e com o objetivo de fornecer informações embasadas sobre o Bilinguismo e Desenvolvimento Cognitivo na Infância. O guia foi elaborado pelos autores usando a plataforma Canva e combina recursos visuais e textuais para melhorar a compreensão. Os resultados enfatizam que o Bilinguismo é comum em muitas pessoas e que as ideias sobre seu conceito e impacto evoluíram ao longo do tempo. O trabalho aborda questões relacionadas ao Bilinguismo na infância, destacando seus efeitos cognitivos e socioemocionais ao longo da vida. Além disso, fornece informações sobre como os pais podem apoiar seus filhos, incluindo incentivo, interesse, recursos e promoção da alfabetização na segunda língua. **Conclusão:** Em suma, o bilinguismo desempenha um papel importante para o desenvolvimento cognitivo infantil, e a criação do guia por meio do método ADDIE é um passo significativo para informar e esclarecer dúvidas dos pais. Através dessa iniciativa, espera-se

que mais pais e responsáveis se interessem e incentivem suas crianças a aprender outra língua, visando como o aprendizado de dois idiomas desde a infância pode enriquecer as habilidades cognitivas, promover a flexibilidade mental e contribuir para uma compreensão mais profunda da diversidade linguística e cultural.

Palavras-chave: Bilinguismo; desenvolvimento cognitivo; guia; infância; pais

OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA POSITIVIDADE EM PACIENTES PEDIÁTRICOS ONCOLÓGICOS

Marina de Araújo Rodrigues
Waleska de Carvalho Marroquim Medeiros

RESUMO

Palavras-chave: Saúde Infantil; psico-oncologia; pensamento positivo; dor do câncer; psicologia positiva

PARA ALÉM DA ESQUIZOFRENIA: UMA ANÁLISE DO FILME PALAVRAS NAS PAREDES DO BANHEIRO

Stephany Suzankly Amorim do Nascimento

Leopoldo N. F. Barbosa

RESUMO

Introdução: A esquizofrenia é uma doença mental caracterizada por distorções do pensamento e da percepção que acarretam intenso sofrimento a quem é acometido pela condição, incluindo familiares, amigos, além de comprometer a autonomia do sujeito. Este estudo traz à tona os atravessamentos do diagnóstico de Esquizofrenia através da análise do filme “Palavras nas paredes do banheiro”. As cenas e narrativas identificam impactos importantes no contexto socioafetivo, que exacerbam padrões de conflitos familiares e impactam negativamente as perspectivas de futuro. A análise reforça a necessidade de suporte especializado à saúde mental que não se limite apenas à contenção de sintomas e considere intervenções direcionadas para reabilitação e inserção social do sujeito.

Palavras-chave: Esquizofrenia; análise de filme; primeiro episódio psicótico; diagnóstico; transtorno mental

RELAÇÃO FRATERNA EM DESENHOS ANIMADOS INFANTIS: ANÁLISE DOCUMENTAL SISTÊMICA

Maria Luísa Veras Vasconcelos Bastos

Tathyane Gleice da Silva Lira

RESUMO

Esta pesquisa documental baseou-se no pensamento sistêmico, para analisar o modo como a relação fraterna foi caracterizada em desenhos animados transmitidos em diferentes décadas no Brasil. Essa relação é um subsistema familiar e ocupa uma função estruturante no processo de subjetivação das pessoas, podendo ser também influenciada por conteúdos veiculados na mídia infantil. Utilizou-se recortes de episódios de três desenhos animados - Os Smurfs, Charlie e Lola e Encanto. Por uma análise microgenética, foram identificados padrões na relação entre irmãos, destacando-se os seguintes fenômenos: intimidade entre irmãos, práticas solidárias, rivalidade, imposição de limites, responsabilidade e a interferência familiar exercida direta e indiretamente ao subsistema fraternal. A perspectiva sistêmica serviu para acessar a complexidade desses fenômenos que compõem a relação fraterna. Considerando a posição ativa das crianças ao assistirem desenhos animados, este estudo pode ser útil à prática psicológica na orientação a pais, apontando a necessidade de novas investigações científicas.

Palavras-chave: Relação fraterna; desenhos animados; análise de sistemas

COMO E POR QUE ALCANÇAR UM SONO DE QUALIDADE: UM GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Guilherme Pires Torres Filho

Ana Flávia da Cunha Santos Rêgo

RESUMO

Este Guia de Orientação para estudantes universitários tem como objetivo explicar, de forma didática, a importância de um sono de qualidade e suas repercussões no processo de aprendizagem, permitindo, assim, uma reflexão sobre a higiene do sono, visando tornar esse processo benéfico e evitar qualquer impacto negativo no desempenho acadêmico.

Palavras-chave: sono; higiene do sono; qualidade do sono

TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO: UMA CARTILHA PSICOEDUCATIVA

Joanna Maria Oliveira da Silva

Rosângela Vieira

RESUMO

Introdução: Este referente estudo mostra que os Transtornos Alimentares (TAs) são condições psicológicas complexas e graves que afetam a relação de uma pessoa com a alimentação e o seu próprio corpo. Tendo um foco especial para com os TAs que são prevalentes entre atletas de alto rendimento já que os mesmos são frequentemente submetidos a rigorosas demandas de treinamento, competições intensas e expectativas de conquistar vitórias, muitas vezes enfrentam pressões significativas para manter um desempenho excepcional e uma aparência física específica. Essas pressões podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Alguns atletas podem recorrer a dietas restritivas, controle excessivo de calorias e comportamentos disfuncionais relacionados à alimentação como forma de atender a essas expectativas. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tem desempenhado um papel crucial no segmento dos transtornos alimentares. Visto que a psicoeducação é uma estratégia utilizada na TCC testada e aprovadas para diversas questões e age a partir da ideia de que quanto mais informada está uma pessoa sobre sua condição de saúde física e mental, sobre seu funcionamento (cognitivo, emocional e comportamental) e sobre a forma como pode ser conduzido seu tratamento, mas ela estará pronta para participar ativamente do processo de mudança. **Objetivo:** Visando isso, foi desenvolvido uma cartilha psicoeducacional como abordagem para a prevenção de transtornos alimentares em atletas de alto rendimento e seus impactos, descrevendo os seus efeitos adversos dos comportamentos alimentares disfuncionais/TAs sobre o desempenho físico e saúde dos atletas, o que fornece um conteúdo informativo e acessível aos pais, responsáveis e a comissão técnica, apresentando recursos e técnicas psicológicas, a fim de auxiliar e promover a conscientização e compreensão dos transtornos alimentares e o impacto entre os atletas, além de incentivar a busca por apoio profissional. **Método:** A cartilha psicoeducativa produzida neste trabalho é acompanhada pela disponibilidade de conteúdos científicos em plataformas como o Google Acadêmico, a APA, SciELO, entre outros. O seu planejamento e o designer do produto são executados por meio das ferramentas disponíveis na plataforma digital CANVA, tendo seu desenvolvimento na consistência da produção de um produto técnico-educacional. Além de ser construída com base

em um modelo de desenho instrucional, composto por cinco etapas segundo o método ADDIE, onde se trata de uma abreviatura das palavras em inglês de: Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. O método é dividido em duas fases, a primeira delas referente à concepção do que se pretende desenvolver, que envolve: 1. A análise das necessidades que precisam ser solucionadas; 2. O desenho do produto representando a solução do problema; 3. E o desenvolvimento deste produto. A segunda fase do método ADDIE diz respeito à implementação e à avaliação do que foi desenvolvido. **Resultado e discussão:** Entende-se que os atletas de alto rendimento compõem um grupo de risco para os TAs e da importância imprescindível da psicoeducação e principalmente do acesso a informações adequadas sobre Transtornos Alimentares (TAs), fatores de risco e a busca profissional especializada. **Conclusão:** Por fim, vale acreditar que todo este trabalho desempenhou um papel fundamental na promoção da saúde mental e física dos atletas de alto rendimento, contribuindo assim na propagação de informações e na conscientização de atletas, treinadores, profissionais da saúde e demais envolvidos no contexto esportivo sobre a importância de reconhecer os sinais precoces e os principais transtornos alimentares (TAs) encontrados nesta área, enfatizando a promoção da prevenção e buscando o tratamento adequado.

Palavras-chave: transtorno alimentar; atletas; alto rendimento; anorexia nervosa; bulimia nervosa; compulsão alimentar periódica; ansiedade

A PSICOLOGIA DO ESPORTE COMO UM CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: UM E-BOOK EDUCATIVO SOBRE A PRÁTICA ESPORTIVA

Maria Eduarda Gois da Rocha

Rosângela Ricardo Vieira

RESUMO

Por ser uma área nova e que está em constante evolução, o E-book tem como foco principal trazer informações para você que tem curiosidade em conhecer melhor a Psicologia do Esporte e o papel que o profissional exerce neste campo, ressaltando também a influência que a mente tem no desempenho dos atletas esportivos. O objetivo foi a construção de um E-book educativo através do método ADDIE, destinado a estudantes e profissionais já formados, mas que pouco conhecem sobre este campo de atuação.

Palavras-chave: Psicologia do esporte

RELAÇÕES ABUSIVAS E SUAS REPERCUSSÕES NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE

Diana Duque de Almeida Braga

Monica Cristina Batista Melo

Palavras-chave: violência de gênero; relações interpessoais; saúde mental

RESUMO

Uma Análise do Filme: Precisamos Falar Sobre o Kevin

A influência da família é significativa para o desenvolvimento do indivíduo. Esta temática está correlacionada com os aspectos relacionados à saúde mental, uma vez que a família, como a primeira instituição à qual o ser humano é inserido, exerce uma forte influência na dimensão psicológica do sujeito, no que diz respeito à formação da personalidade, identidade, valores e princípios. Estes elementos podem ser fundamentados ou modificados ao longo das gerações, de acordo com as experiências e influências ambientais. Tendo isso em mente, este trabalho analisou o filme "Precisamos Falar Sobre o Kevin", adaptado da obra literária escrita por Lionel Shriver. Foi utilizado o método qualitativo/descritivo para examinar a importância dos investimentos desde o desenvolvimento intrauterino e os impactos da negligência relacionada a esses investimentos nas diferentes fases da vida, com foco na construção da identidade. Foram analisadas as cenas em que foi possível identificar os desdobramentos no desenvolvimento do indivíduo diante da negligência nos aspectos afetivos, motores e neurocognitivos. Dessa forma, foram estabelecidas conexões entre o que foi observado nessas cenas e os conceitos teóricos embasados em estudos na perspectiva da psicanálise. Através de recortes do filme e da integração desses conceitos teóricos, este trabalho abordou a problemática apresentada.

Palavras-chave: família; desenvolvimento do sujeito; psicologia; identidade

ANÁLISE DA EFICÁCIA DE UM PROTOCOLO DE MINDFULNESS PARA SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Mateus Marques Coutinho

Leopoldo Nelson Fernandes Barbosa

RESUMO

Introdução: Ansiedade e Depressão são questões de saúde mental que atingem toda a população, em especial os estudantes universitários. Técnicas de mindfulness são práticas acessíveis e não invasivas que podem ser aplicadas para reduzir esses sintomas. Existe uma escassez de literatura voltada para o t ó pico, especialmente no Brasil. **Objetivo:** O presente estudo analisou a eficácia de um protocolo mindfulness em estudantes universitários de uma faculdade de saúde no Nordeste brasileiro. **Métodos:** Ensaio cl í nico randomizado, tipo antes e depois. Os dados para análise foram levantados nos momentos pré e pós intervenção, através de questionário sociodemográfico e Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão. A intervenção foi composta de três técnicas de mindfulness: Relaxamento Muscular Progressivo, Respiração Diafragmática e Imaginação Positiva, aplicadas em 6 sessões de 1 hora de duração. **Resultados:** Participaram 17 adultos, distribuídos 10 no grupo intervenção e 7 no controle. Para o grupo intervenção, foi observada diminuição estatisticamente significativa dos escores de ansiedade e depressão. **Conclusões:** A pesquisa sugere que técnicas de mindfulness são efetivas na redução de sintomas de ansiedade e depressão, quando comparadas ao grupo controle. Considerando que os dados desse estudo são promissores, pesquisas futuras com amostras maiores e acompanhamento a longo prazo são necessárias.

Palavras-chave: ansiedade; depressão; mindfulness

ASSOCIAÇÃO ENTRE AFETOS POSITIVOS E NEGATIVOS, AUTOESTIMA E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SAÚDE

Ana Carolina dos Santos Gomes

Paulo César dos Santos Gomes

RESUMO

Objetivo: Avaliar a associação entre afetos positivos e negativos, autoestima e Transtornos Mentais Comuns (TMC) em estudantes universitários dos cursos de saúde. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e quantitativa. Os instrumentos incluem a Escala de Afetos Positivos e Afetos Negativos (PANAS), Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) e Self Reporting Questionnaire (SRQ-20. **Resultados:** Um total de 421 estudantes participaram da pesquisa, com a predominância do sexo feminino (82,7%). A idade média dos participantes foi de 22,77 anos, variando de 18 a 59 anos. A maioria dos estudantes estava matriculada no curso de Medicina (31,1%), seguido por estudantes de Psicologia (26,7%), com predominância de estudantes que não realizavam acompanhamento psiquiátrico (77,1%) e realizavam acompanhamento psicológico (56,2%). No Self-Questionnaire Report 20, a média de pontos obtidos foi de 8,40 (DP = 5,04). Houve associação significativa entre a variável clínica de realização de acompanhamento psicológico dos participantes e a Escala de Autoestima com a PANAS ($p=0,04$). **Conclusão:** As descobertas indicaram presença de sofrimento psicológico nos participantes, com associações significativas entre a autoestima, afetos positivos e negativos, e a presença de acompanhamento psicológico e psicoterápico, não encontrando correlações significativas entre TMC, autoestima e afetos positivos e negativos. Sugere-se uma produção longitudinal para acompanhar essa população.

Palavras-chave: afetos positivos; afetos negativos; autoestima; transtorno mental comum universitários

A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: UM GUIA PRÁTICO PARA OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS.

Giovanna Rebello de Andrade

Maria Valéria de Oliveira Correia Magalhães

RESUMO

Introdução: A mediação de conflitos é um método que busca promover através de diálogo, cooperação e respeito mútuo a construção de soluções consensuais e duradouras. Nela, o mediador atua como um facilitador, auxiliando na expressão dos pontos de vista e emoções, assim como na escuta ao outro lado e na identificação de suas necessidades e interesses. A mediação se faz relevante no sistema socioeducativo por ajudar na resolução pacífica de conflitos e na promoção da comunicação entre os envolvidos. Sendo, assim, uma alternativa eficaz na prevenção do agravamento de conflitos e na promoção de uma convivência mais harmônica no contexto. Além disso, podendo contribuir para o fortalecimento da cidadania e promoção da cultura de paz, valores fundamentais para a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei. Objetivou-se com o presente trabalho desenvolver um guia prático para agentes socioeducativos, visando a aplicação de técnicas específicas da mediação de conflitos em busca de uma resolução pacífica de conflitos entre adolescentes em conflito com a lei. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a mediação de conflitos e suas aplicações na prática socioeducativa, foi confeccionado um produto técnico educacional na forma de uma guia prático sobre o tema. A capacitação dos agentes socioeducativos é uma peça-chave na promoção da mediação de conflitos como uma abordagem eficaz e humanizada no sistema socioeducativo, visto que esses profissionais desempenham um papel fundamental na transformação da vida dos jovens envolvidos.

Palavras-chave: mediação de conflitos; sistema socioeducativo; guia prático educacional agente socioeducativo

UMA CARTILHA INFORMATIVA PARA PAIS E CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

Sophia Melo Rabelo

Kamilla Layone Rocha Silva Gurgel

Introdução: A infância é uma fase do desenvolvimento humano marcada por muitas descobertas e por um processo de constantes mudanças corporais e cognitivas. Pensando nisso, essa cartilha informativa foi elaborada especialmente para pais/cuidadores de crianças com Doença Renal Crônica (DRC). Trata-se de uma proposta interventiva, que aborda a importância do desenvolvimento da autonomia na infância, especialmente, considerando o contexto do adoecer que pode vir a ser limitador. O público alvo selecionado foram os pais/cuidadores, pois são eles que mais participam das vivências infantis, incluindo a rotina de tratamento exigida por uma DRC. Portanto, ressaltamos a importância do estímulo a promoção da autonomia, diante das possibilidades dentro do processo da doença.

Palavras-chave: doença renal crônica; infância; autonomia